



3446034937 G12.058

910

21

中 医 診 療 常 識

胡 友 梅 編 寫



福 建 人 民 出 版 社

2000

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我先试读，QQ45472743微信s38772614，您的移动书库 低价 高效 专业。

目 錄

第一章 診法錄要 (1)

(一)問症歌..... (1)

(二)切脉說明..... (2)

(三)脉象分类表..... (2)

(四)死症怪脉表..... (3)

(五)婦人診病歌..... (4)

(六)辨舌歌..... (4)

(七)聞声歌..... (5)

(八)望診歌..... (6)

(九)小儿診法說明..... (6)

(十)小儿診法歌..... (6)

第二章 療法錄要 (7)

(一)呼吸器病..... (7)

1.虛癆 2.咳嗽 3.气喘

(二)循环器病..... (8)

1.心痛 2.怔忡

(三)消化器病..... (9)

1.胃痛 2.腹痛 3.膈食 4.反胃 5.脹滿蠱脹 6.嘔吐

7 呃逆 8.伤食積聚 9.泄瀉 10.五更瀉 11.疝气

(四)排泄器病..... (11)

1.水腫 2.汗症 3.癰閉

资源分享朋友圈
3446034937



资源整理不易!
如果帮助到您!
感谢您打赏支持!

(五) 神经系病..... (12)

1. 中風(即腦出血) 2. 眩暈頭痛 3. 癲狂癰 4. 脚氣

(六) 全身病..... (14)

1. 血症 2. 風濕(瘋痺痿等) 3. 黃疸 4. 消渴

(七) 男生殖器病..... (15)

1. 陽痿 2. 遺精 3. 淋病

(八) 女生殖器病..... (16)

1. 月經病 2. 帶下 3. 胎前 4. 臨產 5. 產后 6. 乳病

(九) 儿科病..... (18)

1. 鵝口 噤口 撮口 2. 脾風 3. 急驚 4. 慢驚 5. 慢脾
6. 疳症

(十) 外科病..... (19)

1. 瘡瘍 2. 損傷 3. 癰癤 4. 痔瘡 5. 耳病 6. 眼病
7. 牙舌病 8. 喉病

(十一) 花柳病..... (22)

1. 赤白濁 2. 楊梅瘡 3. 下疳 橫痃 魚口 便毒

(十二) 傳染病..... (22)

1. 感冒(傷風時症) 2. 腸熱(腸傷寒) 3. 痧疹 4. 霍亂
5. 痢疾 6. 癘疾 7. 鼠疫 8. 流行性腦膜炎 9. 痘瘡(俗稱天花)
10. 麻疹

附 錄..... (26)

(一) 傷寒症治..... (26)

1. 六經病象七言歌..... (26)
2. 六經症治總表..... (27)
3. 太陽症治表..... (27)
4. 少陽症治表..... (28)

5. 陽明症治表·····	(29)
6. 太陰症治表·····	(29)
7. 少陰症治表·····	(30)
8. 厥陰症治表·····	(31)
9. 傷寒症治五言歌·····	(31)
(二) 溫病症治·····	(33)
1. 溫病七言總歌·····	(33)
2. 溫病上焦診治表·····	(34)
3. 溫病中焦診治表·····	(34)
4. 溫病下焦診治表·····	(35)
5. 風溫五言歌·····	(35)
6. 暑溫五言歌·····	(35)
7. 濕溫五言歌·····	(36)
第三章 藥方歌訣 ·····	(36)
附錄：八法藥性賦 ·····	(82)
(一) 汗下法用藥·····	(82)
(二) 溫法用藥·····	(83)
(三) 清法用藥·····	(84)
(四) 補法用藥·····	(86)
(五) 消法用藥·····	(87)
(六) 和吐法及其他用藥·····	(88)

第一章 診法錄要

中医診病以切脉辨舌为主,而聞声望色等次之,小儿尙应注意看手紋,現均叙其大略。但問診是治療上最重要的項目,陈修園的問症歌簡單扼要,易于誦讀,故首先錄出。

(一) 問症歌(錄自“陈修園医書”)

一問寒熱二問汗。(問其寒熱多寡,以審陰陽,細辨真假。問其汗之有无,以辨風寒,以別虛實。)

三問頭身四問便。(問其頭痛為邪甚,不痛為正虛,暴眩為風火與痰,漸眩為上虛氣陷。問其身之部位,以審經絡,亦以一身重痛為邪甚,軟弱為正虛。問其小便紅白多少,大便秘澀、清谷、清水,以別寒熱虛實。)

五問飲食六問胸。(問飲食,以察其胃氣之強弱。問胸者,該胃口而言也,濁氣上干則胸滿,痛為結胸,不痛而脹,連心下為痞氣。)

七聾八渴俱當辨。(問聾者,傷寒以辨其在少陽與厥陰,雜病以聾為重,不聾為輕也。問渴者,以寒熱虛實俱有渴,大抵以口中和,索水不欲飲者為寒;口中熱,引飲不休者為熱;大渴譫語不大便者為實;時欲飲水,飲亦不多,二便通利者為虛症。)

九問旧病十問因。(問旧病以知其有夙疾與否。問其致病之因,以為用藥之准。)

再兼服藥參機變。(表里寒熱補瀉之中,自有神機變化之妙。)

婦人尤必問經期,遲速閉崩皆可見。(婦人以經為主,問其

有无迟速，以探病情，兼察有孕与否。）

再添片語告儿科，天花麻疹全占驗。（小儿欲作痘疹，与外感同，宜辨其手中指、足脛、耳后筋色为据。）

（二）切脈說明

用三指前后排列按于病人手腕血脉搏动之处，每指按处，各为一部，三指共分三部，名寸、关、尺。左手之寸关尺位，系屬心、肝、腎部；右手之寸关尺位，系屬肺、脾、命部。（命即命門，陈修園以为女之產門，男之精門也。亦有的以为兩尺之脉皆屬腎。）視其各部脉象之度，以断其臟腑所受之病，是为切診。

妇人之脉与男子同，惟兩尺之脉常盛于兩寸；若反之，即系經閉或不調之症。

（三）脈象分类表

脉的总綱	脉 象	病綱	脉的 条 目	形 象 及 按 法	主 病
浮	輕按（按在皮膚以上）乃得，重按不見	在表	孔	有边无中，如以手指着葱	失 血
			革	中空外强，如以手指按鼓皮	亡 陽
			散	散而不聚，來去不明	气血兩虛
沉	重按（按在肌肉以上）乃得，輕按不見	在里	伏	沉甚，須重按着，指乃得	邪 閉
			牢	沉而有力，按时覺得底硬	寒 实
迟	一息二、三至（每分鐘在六十搏以下）	屬寒	瀉	往來干瀉，不流利	血 少
			結	迟中时有一止，但无定数	气郁痰滯
			代	迟中时有一止，止有定数	气絕（孕 妇无妨）

数	一息五、六 至（每分鐘 在八十搏以 上）	屬 熱	滑	往來流利	痰 飲
			緊	數如牽繩轉索	寒邪而痛
			促	數中時有一止，但無定數	陽邪內陷
細	如蜘蛛絲	主 虛	動	見于關中，如豆搖動	崩中脫血， 陰陽相搏
			微	微細不顯明	陽虛欲絕
			濡	細而浮小，如絮浮在水面	濕 重
大	闊 大	主 實	弱	沉而細軟	血 虛
			洪	應指如水波涌起，來盛去衰	熱甚內虛
			弦	突而端直，狀如弓弦	寒 或 痛
			突	大而堅硬	實 邪
短	脉部縮而不長，寸尺兩部不見				素稟虛弱
長	脉部甚長，寸尺兩部可見				素稟強盛

(四) 死症怪脈表

雀 啄	脉在筋肉，連連搏指，忽然中止，少頃復來，如雀之啄食。	肝 絕
屋 漏	脉在筋肉，如水从檐上漏下，良久一滴。	胃 絕
彈 石	脉沉于筋間，撈之，急硬，如以指彈石。	腎 絕
解 索	脉在指下散亂，乍數乍疎，如解索之狀。	脾 絕
魚 翔	脉在皮膚，頭定尾搖，似有似無，如魚之翔。	心 絕
蝦 游	脉在皮膚，杳然不見，忽又急來，如蝦之游。	腸 絕
釜 沸	脉在皮膚，浮于指下，有入無出，如釜中水沸。	肺 絕

(五) 妇人診病歌 (友梅撰韵)

妇人尺脉辨多端，
大旺应將有孕看（兩尺脉大为有孕），
滑疾代兼怀燕兆（各部之脉俱滑疾或和滑而代，皆为有孕），
濇微象見育麟难（尺脉濇微，为經水不調，难以得孕），
經离胎动知將產（將產之脉必异經常，名曰离經），
陰尽血崩識命殘（陰尽，脉不上关^注，產后血崩得此多不治），
更有乳房左右脹（云左脹为男，右脹为女），
旧傳男女診难瞞。

注：脉不上关为陰尽，乃寸部有脉搏；关部脉搏細微，尺部沒有脉搏。

(六) 辨舌歌

一 (注)

舌上无胎表症輕，
白胎半里古章程（白胎为半表半里症），
热紅寒淡參枯潤（津枯而紅多热症，色淡而潤多寒症），
陰黑陽黃辨死生（三陰病，舌多黑，三陽病，舌多黃，若反之，則难治），
全現光瑩陰已脫（舌上无胎，如去油猪腰，名鏡面，不治），
微籠本色气之平（淡紅中微籠白胎为胃气，无病），
前人傳有三十六（古人有三十六胎之說），
采摘多岐語弗精。

注：此歌訣系錄自陈修園医書，注釋部分系作者加上。

二（友梅撰韵）注

由來熱病甚堪哀，

舌象多端要細裁，

如假灰焦裂有刺（假熱症，全舌灰黑色，干糙焦裂，有芒刺、厚苔），

是真白磷積難開（真熱病，全舌白色，有点花磷裂積沙，刮之不淨，重則出血），

滯干實熱黃兼黑（實熱症，全舌或黃或黑，且積滯、干焦、磷裂有芒刺），

滑軟虛寒白帶灰（虛寒症，全舌淡白、滑軟、无苔点及磷縫），

還有初傳色亦白（邪初傳里及寒滯積中，全舌白滑，有厚膩之苔），

更多液涸絳无苔（血虛液涸症，全舌絳色，无苔或有橫直磷紋而舌短小不等）。

注：因修園辨舌歌过于簡略，特取通俗傷寒論學說作此補充。

（七）聞聲歌（注）

言微言厉盛衰根（氣衰言微為虛，氣盛言厉為實），

謔語實邪錯語悞（狂言怒罵為實熱，言語錯亂為神悞），

虛呃痰鳴非吉兆（久病呃者或有痰鳴，皆為凶象），

聲音變旧恐离魂（言語聲音變常者凶）。

注：此歌訣系錄自陳修園醫書，注釋部分系作者加上。

(八) 望診歌 (友梅撰韵)

鮮妍滯濁論容姿，
外感沉疴要細知 (外感不妨滯濁，久病忌呈鮮妍)，
赤愛鷄冠憂血聚 (赤如鷄冠者生，赤如衄血即似凝聚之血者死)，

青宜翠羽忌草茲 (青如翠羽者生，青如草茲即青中帶白者死)，
豕膏枯骨白多异 (白如豕膏者生，白如枯骨即白而干枯者死)，
烏羽烟塵黑有歧 (黑如烏羽者生，黑如烟塵即黑而帶黃者死)，
黃色更应如蟹腹 (黃如蟹腹者生)，
倘如枳实症堪危 (黃如枳实即黃帶青者死)。

(九) 小儿診法說明

五歲以下小儿，不能別其脉象，只察食指現于外皮之絡象 (即手紋)。第一節为風关，第二節为气关，第三節为命关。男子察其左手，女子察其右手。凡紋色紫者为热，紅者为寒，青者为驚風，白者为疳積，淡黃者为无病，黑者为危症。現于風关者病輕，現于气关者病重，現于命关者病危。至于五歲以上，乃用一指就寸、关、尺之位統切之，与大人同。惟每息以六至为准，加則病热，減則病寒。

(十) 小儿診法歌 (友梅撰韵)

小儿風气命三关，輕重与危分別看。青色为驚白疳積，
紫紋具热紅受寒。涕多疹痘兼肢冷，脉乱变蒸又食难。
五歲孩提休問切，淡黃絡象保安安。

第二章 療法錄要

(一) 呼吸器病

1. 虚 癆

病狀：昔人云：七情（喜怒哀樂愛惡欲）受傷為七傷，五臟（心肝脾肺腎）得病為五癆。其症為倦怠少食，常發熱或寒熱往來，氣色日見憔悴，肌肉日見消瘦，即將入癆症之門。若咳嗽不已，吐血時來時止，是已成癆症，多不治。

治法：補脾：如少食倦怠，大便或澀或秘，則以治脾為急，以四君子湯（1）注六君子湯（2）、歸脾湯（5）主之。

滋腎：如形傷骨痿，面色黧黑，骨蒸煩熱，腫痛氣喘，或畏寒、腹痛、遺精，則以滋腎為急。以六味丸（6）、八味丸（7）主之。

止汗：如盜汗、自汗，宜用當歸六黃湯（8）。

退熱：如脾肺兩虛，發熱惡寒，肢體倦怠，少食作瀉，宜用人參養榮湯（9）。


調養：宜用七味鴨（11）。

2. 咳 嗽

病狀：諸氣上逆于肺，則喘而咳。其症分為內傷、外感兩種。

內傷：咳而帶痰或有咯血，音嘶、息短、體質虛弱、脈象細數。

注：文中的阿剌伯數字系第三章藥方的序數，同一藥方再次出現則不加序數。



外感：头痛、寒热、流涕、胸悶、脉象浮滑。

治法：內伤須按虛癆治。外感通常用六安煎（12）（修園常去芥子，加干姜、細辛、五味、杏仁）为最穩。如因寒不論冬夏，俱用小青龍湯（13）。如因熱，寒熱往來，有咳嗽者，宜用小柴胡湯（14）去人參、大棗、生姜，加干姜、五味。帶血則用麥門冬湯（15）、五味子湯（16）等治療咳血要藥。

3. 氣喘

病狀：氣急上奔，謂之喘促。其症分为虛實兩門。

治法：實症：肺氣實而氣路閉塞，宜用葶藶大棗瀉肺湯（17）。虛症：氣促不能接續，而脉虛無力，宜用都氣丸（23）。通治：六君子湯加干姜、細辛、五味子等治喘神藥。此外，如黑錫丹（18）、蘇子降氣湯（19）均有止喘之效。

（二）循環器病

1. 心痛

病狀：旧時以心包絡及胃痛均謂心痛，而这里是指心病而言（即西醫之心臟內膜炎也）。其症为發熱日久不退，或寒熱往來，痛在心部，亦有兼心悸亢進者。

治法：如痛甚用加味百合湯（22）。如兼發熱用五積散（20）。兼心悸用天王補心丹（21）。

2. 怔忡

病狀：驚悸不寧，心臟搏動，或脉現結代，亦有兼全身浮腫者。

治法：通常用歸脾湯去木香，加麥冬、五味子、枸杞，或用都氣丸。如脉現結代用復脉湯（24）。如浮腫用濟生腎氣丸（26）。

(三) 消化器病

1. 胃 痛

病狀：胃部（在臍上）剧痛，按之稍差，甚者昏迷倒地，其糞便不失色。

治法：因積用平胃散（27）加木香、砂仁、山查、麥芽。多酸宜用吳茱萸湯（30）加木香、川連。多痰宜用二陳湯（31）加白朮、澤瀉。有熱宜用金鈴子散（34）。受冷宜用理中湯（35）加附子、桂枝。

2. 腹 痛

病狀：臍之周圍疼痛，痛有作止，壓之稍差，放屁後覺稍松。

治法：下利、脹滿、嘔吐，宜用理中湯；下利雷鳴、嘔吐，宜用附子粳米湯（36）。實症有便閉、腹脹滿而痛者，宜用厚朴三物湯（37）；便閉兼發熱而痛，宜用厚朴七物湯（38）。有痰飲結聚致脾胃不和而痛，宜用香砂六君子湯（3）。脅下疼痛，時吐酸水，宜用茱萸連丸（39）。

3. 膈 食

病狀：旧称胃液干燥致固体食物不能下咽而阻隔。

治法：常法用左歸飲（41）去茯苓，加當歸、生地。如有嘔吐，用啓膈飲（42）。

4. 反 胃

病狀：朝食暮吐，暮食朝吐。

治法：常法用吳茱萸湯或理中湯加附子、茯苓、半夏、川椒等。如痰飲，用六君子湯加干姜、附子。

5. 脹滿壘脹

病狀：心腹內脹，而其他部位不腫。

治法：常法宜用平胃散。如为实症，腹滿拒按，宜用厚朴七物湯；腹滿而痛、便实，宜用厚朴三物湯。如为虚症宜用香砂六君子湯。如單腹脹，腹大如鼓，而四肢不腫，宜用枳朮湯（43）加砂仁、內金等。

6. 嘔吐哕

病狀：嘔者有物无声，哕者有声无物，吐者声物俱出。

治法：常法用二陈湯（倍半夏加生姜），若寒加丁香、砂仁；热加黃連、竹茹、石斛；食積加神曲、山楂、麥芽、干姜；哕甚加代赭石、旋复花。如食谷即吐及吐嘔涎沫，宜用半夏瀉心湯（47）或吳茱萸湯。如食不得入，宜用進退黃連湯（44）。

7. 呃逆

病狀：气冲有声，声短而頻。寒症为头痛、惡寒、發热、脉緊，或腹痛、口中和、手足冷、脉微。热症为口渴煩躁，甚者潮热，狂乱，腹滿便鞭。虚症多在大病身体虚損之后產生。

治法：普通用代赭旋复湯（45）。寒症用二陈湯倍加生姜、陈皮。或用理中湯加丁香、砂仁。热症宜用黃芩加半夏生姜湯（50）或三承气湯（91）（92）（93）。虚症宜用六君子湯或六味湯、八味湯。通用藥为二陈湯加竹茹、橘皮。

8. 伤食积聚

病狀：胸悶、吐酸水、噯腐、腹脹腹痛。

治法：常法用平胃散加麥芽、山楂、神曲、萊菔子等。如为痰積，平胃散加南星、半夏。如为酒積，平胃散加葛根。如为水積，平胃散加猪苓、澤瀉、桑白皮、赤小豆。如为肉積，平胃散

加山查。如为果積，平胃散加草果。有寒平胃散加干姜、肉桂、附子。有热平胃散加黃連、黃芩。脹滿日久不消者，平胃散加枳实、大黃。如脹滿嘔者，用半夏瀉心湯。如兼發热用黃連湯（48）。兼吐酸用吳茱萸湯加黃連。

9. 泄瀉

病狀：即下瀉不止之病，古人以为是湿气过甚所致。

治法：常法用胃苓散（29）（有热、下利有腸垢，加黃芩、黃連；热甚去桂枝，加葛根；寒甚下利清谷加吳茱萸、附子；腹痛加木香；体虛加入参、附子；食積加山查、神曲；酒積加葛根）。寒症用理中湯。脾虛下泄用补中益氣湯（69）加禹余粮、訶子，或用香砂六君子湯加禹余粮。

10. 五更瀉

病狀：瀉时常在五更，古名为“脾腎病”，难治。

治法：主以四神丸加入参、白朮、干姜、附子、茯苓、粟壳，久服或加谷芽。此外，半夏瀉心湯、黃芩湯（49）、黃連湯均可治之。

11. 疝气

病狀：系男人小腹睪丸腫痛。妇女小腹腫痛亦屬之。

治法：常法用五苓散（51）加川棟子、木通、木香、桔核、荔枝等。如为久病宜用三層茴香丸（53）。如睪丸腫大而痛宜用千金翼洗方（54）或用荔枝三、五錢，亦有效。

（四）排泄器病

1. 水腫

病狀：皮膚浮腫。初起目下如臥蚕（呈腫脹狀），后漸及全

身，口渴，小水多，色赤甚，气喘。如屬寒，小便自利、口不渴，为陰水。如屬熱，小便短赤、口渴，为陽水。实症：壯年腫病驟起，为脾实。虛症：老弱或病久，腫脹漸成，为脾虛。

治法：屬寒用五皮飲(55)加白朮、蒼朮、附子、干姜、木香等。上半身腫加防風、蘇叶；下半身腫加防己、白朮、地膚子。屬熱用五皮飲加滑石、木通、車前、麥冬、木香等。实症用五皮飲加蘿卜子、白芥子、枳实、葶藶等。虛症用五皮飲加人參、砂仁、白朮等。如兼脹滿，宜用胃苓散。如日久或有喘促宜用濟生腎氣丸。

2. 汗 症

病狀：自汗：醒睡俱出汗为陽虛，其人畏寒。盜汗：睡時出汗，醒時則否，为陰虛，其人畏熱。自汗兼盜汗：为陰陽俱虛，其人有怔忡、不眠、煩躁等症。

治法：自汗宜用玉屏風散(56)(以黃耆为君，量可加至五、七錢)。盜汗宜用當歸六黃湯。自汗兼盜汗宜用歸脾湯去木香，加麥冬、五味子、生牡蠣、龍骨，或用人參養榮湯。

3. 癰 閉

病狀：小便点滴不通，甚而为脹为腫，喘滿欲死。熱症：小腹脹痛，尺脉旺。寒症：小腹不痛，尺脉弱。

治法：通常用八正散(57)，或加麻黃、杏仁，夏天可用蘇叶、防風以代麻黃。如为熱症宜用滋腎丸(58)。如为寒症宜用濟生腎氣丸。

(五) 神經系病

1. 中 風(即腦出血)

病狀：驟然卒倒，不省人事，牙關緊閉，痰涎上壅，危在傾

刻。閉症：其人素有郁熱者為熱風，多見閉症。有唇緩、失音、鼻塞、耳聾、目瞽、握拳、便秘等症狀。脫症：其人素有虛寒者為寒風，多見脫症。有口開、手撒、眼合、遺尿、聲如鼾睡、汗出如油等症狀。

治法：常法以小續命湯(59)為主。閉症宜用三化湯(60)，但用滌痰湯(33)、稀涎散(61)亦可。脫症宜用參附湯(62)，并輔以薯附湯(63)、歸附湯(64)、朮附湯(65)等。中風不語宜用資壽解語湯(66)及加味六君子湯(4)。

2. 眩暈頭痛

病狀：實症：邪在表者，寒熱、脈緊、流涕、咳嗽、脊背疼痛；邪在里者，內熱、脈洪、腦痛兼脹。虛症：因血虛者，蒸熱、脈弦、痛兼煩躁；因氣虛者，遇天陰或寒冷而痛，倦怠、脈微。

治法：實症：邪在表者，主以九味羌活湯(67)；邪在里者，主以一味大黃散(68)。虛症：因血虛者，宜用六味湯加萸蓉、細辛、川芎；因氣虛者，宜用補中益氣湯加蔓京、川芎。眩暈宜用防眩湯(70)。偏正頭風宜用頭風藥(71)。真頭痛：痛甚腦有病，手足冷至節，宜吞服黑錫丹或吳茱萸湯。

3. 癲 狂 癇

病狀：癲：笑哭無時，語言無序，其人常靜。狂：罵詈，不避親人和生人，其人常動。癇：忽然昏倒，不省人事，口角流涎，手足抽掣或發出五畜聲，數刻即愈，作止有間斷。

治法：癲：多為虛症，以溫胆湯(72)、礞砂丸(73)主之。狂：多為實症，以礞石滾痰丸(74)加烏梅，礞砂丸和生鐵落飲(75)主之。癇：若火氣盛，宜用當歸龍薈丸(76)，若頑

痰積，宜用丹礬丸（77）。

4.脚 氣

病狀：濕性：兩腳腫大，甚者氣喘、怔忡，小腹不仁。干性：兩脛不腫，或頑麻，或攣急，或緩縱。

治法：濕性宜用雞鳴散（78），日久可服八味地黃丸。干性宜用四物湯（102）加牛膝、獨活、蒼朮、木瓜、澤瀉；熱症加知母、黃柏、茵陳；寒症加干姜、附子、吳茱萸、肉桂等。

（六）全 身 病

1.血 症

病狀：血氣錯亂，病在中焦，凡吐血、咯血、咳血、鼻衄、齒衄、舌衄、大便出血、小便出血、血淋、血崩皆屬之。

治法：外感吐血、衄血，常用四生飲。內蘊虛熱而致吐衄、便血及血崩，宜用犀角地黃湯（85）。溫攝：凡血症服涼潤藥而益甚者，宜用理中湯。涼瀉：火勢甚而脈洪者，宜用柏葉湯（81）。特种：吐衄或齒齦出血，俱宜用甘露飲（82）。如有血淋血尿，用海螵蛸、干地、赤茯苓各等分爲末，以柏葉、車前子煎湯送下。婦人血崩宜用當歸補血湯（83）加熟地、附子二、三錢，或用龍牡地黃榴梅丸（84）。此外，犀角地黃湯治吐血、衄血、血崩亦有效。

2.風溼（癱瘓痿等）

病狀：痛風：肢節走痛。癱瘓：身體麻木不仁。腰痛：腰部痛并及脚部。鶴膝風：脛細而膝腫痛。

治法：痛風：初起發熱頭痛，宜用五積散；病成後須用獨活寄生湯（86）。癱瘓、腰痛均主以五積散。鶴膝風：初起可用五

積散；日久体虛者，宜用十全大補丸（10）加附子、牛膝、杜仲、防風、獨活等。

3.黃疸

病狀：陽黃：全身皮膚呈黃色，明澄如橙，煩渴，頭出汗，小水赤，大便結。陰黃：身眼色黃，面色如煙熏，肢體重著，胸脹腹滿，自汗自利，小便渾濁。

治法：宜用茵陳蒿湯（87），陽黃加大黃、梔子；陰黃加附子、干姜。輕者用豬苓散。

4.消渴

病狀：上消：大渴引飲，舌面赤裂，咽熱如焚，小便頻數。中消：多飲易飢、自汗、大便緊、小便數。下消：煩躁引飲，飲亦不多，隨而尿下，小便濁，腿膝日枯，骨節痠痛。

治法：常法用七味丸（88）或六味丸加桂心、五味子。上消宜用白虎加人參湯（90）。中消用調胃承氣湯。下消宜用腎氣丸（94）。

（七）男生殖器官病

1.陽痿

病狀：陰莖不能勃起，防碍生殖機能。

治法：常法用還少丹（95）或六味地黃丸各加淫羊藿、肉蓯蓉、北枸杞、鎖陽等。體虛潮熱宜用人參養榮湯。下元衰弱宜用八味地黃丸。

2.遺精

病狀：夢遺：每夢與女人交合，因而洩精，久則神思恍惚，脈洪弦。滑精：無夢自遺，出于不覺，脈象多虛細。

治法：夢遺：宜用龍胆瀉肝湯（96）或封髓丹（97）主之。

滑精：宜用金鎖固精丸（241）或十全大補丸加兔絲子、龍骨、牡蠣等。

3. 淋 病

病狀：小便痛澀，欲出不出，欲止不止，其病共有五種。膏淋：下如蒸脂。石淋：下如砂石。勞淋：因辛勞過度而得。氣淋：氣滯不通，臍下悶痛。血淋：瘀血停蓄，陰莖中痛如割。

治法：常法以五淋湯（98）為主。石淋：五淋湯煎送髮灰、滑石。膏淋：五淋湯合萆薢分清飲（99）。氣淋：五淋湯加荊芥、香附、麥芽、蘇梗等。勞淋：五淋湯加參芪或合補中益氣湯。血淋：五淋湯加牛膝、郁金、桃仁，并調麝香一、二厘。

（八）女生殖器病（經帶胎產為婦科的四大病症）

1. 月經病

病狀：先期：經來過早，因熱者血多鮮紅，氣虛者人必疲弱。后期：經來過遲，因寒者色淡而少；因虛者形瘦膚燥，有勞傷之象，俗稱血癆。錯雜：經來或早或遲不一，多因氣血敗傷或思慮郁結所致。閉塞：月經閉塞，一個月以上不來。崩漏：經來如潮涌謂之崩，經來十余日或連月不止謂之漏。

治法：四物湯統治經症百病。若氣血雙虛，可服八珍丸（103）。先期用四物湯加續斷、地榆、黃連之類。后期用四物湯加干姜、肉桂、附子之類。如為錯雜，氣血傷者用四物湯加入參、白朮、蒼朮之類；因郁結者宜用逍遙散（100）。閉塞宜用歸脾湯。崩漏宜用荊芥四物湯（102）或膠艾四物湯（105），日久可用補中益氣湯或十全大補丸各加阿膠、側柏葉等。

2.帶 下

病狀：濕熱：帶下赤白、氣味腥，腰痛，頭暈，面色萎黃。

虛損：帶下血薄，腹痛腰痠，脈虛無力。

治法：濕熱：宜用加味逍遙散（101）或威喜丸（107）加黃柏、滑石、烏賊骨、知母之類。虛損：宜用補中益氣湯加棗仁、山藥、黃柏之類，或八味丸加兔絲、車前等。

3.胎 前

病狀：惡阻：有孕，經停兩三個月後，噁心嘔吐，喜食酸味之品。胎漏：有孕數月後，胎動腹痛下血，亦有因跌打損傷而致。流產：有孕未足月而產出，或已成為習慣。

治法：凡胎前百病，均可用保產無憂方（108），有胎即能安胎，臨產即能催生。不拘月份，凡胎動不安，腰酸腹痛皆主之。惡阻宜用惡阻方（109）。胎漏宜用胎漏方（110）。流產宜用千金保孕丸（111）。

4.臨 產

病狀：難產：已見兒首，而不能產出，或橫生、逆生。漿水過多：血下太多或久下不止。胞衣（即胎盤）不下：兒產出而胎盤不下。

治法：難產宜用加味芎歸湯（112）。漿水多宜用當歸補血湯。胞衣不下宜以醋湯送下失笑散（113）。

5.产 后

病狀：惡露：瘀血下不尽，腹痛（此痛亦稱兒枕痛，俗稱血塊痛）。風痙：中風、發熱、面赤、氣喘、頭痛。

治法：惡露宜用生化湯（114）。有血塊、痛甚，加益母草、元胡索、山楂炭等。此方加減，能治產後百病。風痙以竹葉湯（115）主之。

6.乳 病

病狀：乳汁不通：產婦因初產乳脉未行，或因生產過多氣血虛弱，致乳汁不通或短少。無子食乳腫痛：此症甚者，發熱、乳頭有結核，久之將成為乳岩。內吹：有孕時，乳核腫大。外吹：嬰兒食乳時，乳核腫痛。

治法：乳汁不通：用四物湯加木通、滑石，養豬蹄湯食之。腫痛宜用回乳四物湯（106）。如發寒熱，宜用荊防牛蒡湯（117）。內吹用柴胡清肝湯（118）。外吹用荊防牛蒡湯。

（九）兒 科 病

1.鵝口、噤口、撮口

病狀：鵝口：白屑生滿口舌，如鵝口。噤口：舌上生瘡，如黍米狀，不能吮乳，啼聲漸小。撮口：舌撮如囊，口唇青，面色黃或赤，不能吮乳，症甚危險。

治法：鵝口宜用清熱瀉脾湯（119）。噤口宜用龍胆湯（120）。撮口宜用龍胆湯。

2.臍 風

病狀：初生兒忽然牙關緊閉，腹腫臍腫，日夜啼叫，臍邊呈青黑色，并有青筋現于臍上。若筋延至心部，或嬰兒生下在七日內就得病者皆不治。

治法：初起宜用驅風散（121）。重症宜用牛黃鎮驚丸（242）。熱甚宜用龍胆湯。

3.急 驚

病狀：卒然而發，壯熱煩急，面青唇赤，痰壅氣促，牙關緊閉，二便秘滯。

治法：常用清热鎮驚湯（122）。痰盛用牛黃丸（123）。
熱甚用加減涼膈散（125）。

4.慢驚

病狀：發時緩慢，抽搐時作時止，面色淡黃或青白相兼，身體溫和，昏睡，眼合或露睛，脈來遲緩，大便青色。

治法：普通用可保立甦湯（130）。脾虛痰盛用醒脾湯（126）。

5.慢脾

病狀：多因吐瀉日久，脾氣大傷，遂致閉目、搖頭、面唇青黯、額上出汗、昏睡、四肢却冷、舌短、聲啞、頻嘔清水等症。

治法：因吐瀉亡陽用溫中補脾湯（127）。如大病後致成者用固真湯（128）。如精神已虧、身體瘦弱以加味理中湯（129）加附子主之。

6.疳症

病狀：初起尿如米泔，午後潮熱，久則青筋暴露，肚大堅硬，面色青黃，肌肉消瘦，眼睛發眵。此症即大人之勞症，凡十五歲以下之患者，皆名為疳。

治法：消積用清肝理脾湯（131）或肥兒丸（132）。調脾用參苓白朮散（133）。

（十）外科病

1.瘡瘍

病狀：腫瘍：多見實症，火盛氣滯，惡寒發熱，大小便不通，亦有色白平塌之陰疽。潰瘍：多見虛症，其毒化濃易潰，身體衰弱，瘡口不能收斂。

治法：腫瘍：初起時赤腫焮痛，宜用仙方活命湯（134）；膿勢將成而未成之際，宜用托里消毒散（135）；陰疽結核，宜用陽和湯（136）。潰瘍：宜用十全大補丸；不能收斂，宜用人參養榮湯加五味子、白蘂；多膿水，宜用保元大成湯（137）。癰疽潰后，以四物湯為主，氣虛加參芪，痛加乳香、沒藥、肉桂等，血虛寒熱加柴胡、黃芩等，熱加丹皮、地骨皮等。

2. 損 傷

病狀：未破口：腫痛、青筋浮起，甚者氣絕，牙關緊閉。已破口：無論金創、木創及他創，多有寒熱交作，甚者，咬牙吐沫，手足扯動，頭如彎弓。傷口潰爛者較輕，傷口平塌者極重。

治法：未破口：若氣初絕時，宜速灌當歸湯（133），又防瘀血攻心，宜用白糖飲（139）。已破口：宜用玉真散（140）（外敷或內服均有效）。如血流不止，可用刀傷止血藥（141）。

3. 瘰 癧

病狀：多生在耳前、項后、腋間，小者為瘰，大者為癧。生在項前為痰癧，項后為濕癧，左右兩側形軟、發怒即腫為氣癧，堅硬、筋縮為筋癧，連綿如貫珠為瘰癧。雖形狀各異，但都為痰、濕、氣、熱之毒所致。

治法：初起宜用消瘰丸（142）。病久潰爛宜用逍遙散或陽和湯加夏枯草、海藻、昆布之類。

4. 痔 瘡

病狀：痔瘡：生于肛門口，肉珠狀，形如雞髻，為外痔。如生于肛門內，肛門痛痒，即系內痔。漏瘡：痔瘡成管，隨時流出血水或膿汁。

治法：痔瘡：不論新舊，凡便血、重墜作痛，各宜用防風蓁

芎湯(143)。漏瘡：如已成漏，宜用補中益氣湯或四物湯或六味丸。

5. 耳 病

病狀：耳痛：痰火上升，耳朵紅腫疼痛，時流膿血或如聞蜂鳴。耳聾：病後眼目時黑發花，脈微細，精力不足。

治法：耳痛：宜用龍胆瀉肝湯。耳聾：如先鳴而後聾，宜用六味丸去丹皮，加磁石、五味、龜板等；如感冒暴聾，宜用逍遙散去白朮，加半夏、生姜、玉竹、大棗等。

6. 眼 病

病狀：天行赤眼：為四時流行風濕之毒所致。眼睛赤腫流淚、羞明、疼痛。因障：外看似好眼，不痒也不痛，但不能見物。瞳孔之內有青白點，是內障；上下胞有努肉蓐蕾，久而生翳，遮蔽在眼外，是外障。

治法：赤眼宜用疏風清肝湯(144)。如因障，內障宜用磁砂丸；外障宜用瀉肝湯(145)。

7. 牙 舌 病

病狀：牙痛：牙床紅腫疼痛，喜熱惡寒。牙疳：牙根臭腐，齒落，若病發作後，數日就穿腮破唇，即為走馬疳。口舌生瘡：口內或舌面破裂且腫。

治法：牙痛宜用涼膈散(124)。牙疳宜用蘆薈消疳飲(146)。口舌生瘡宜用天王補心丹。

8. 喉 病

病狀：喉風：咽喉痛，聲音難出，痰聲似曳鋸，湯水難下。喉蛾：即乳蛾，生于咽喉之旁，狀如蚕蛾。兩者重，單者輕；生于關前者，形色易見，生于關後者不見，難治。

治法：通常宜用喉痛方（147）或养陰清肺湯（143）。喉風宜用清咽利膈湯（149）。喉蛾用方同上。

（十一）花 柳 病

1.赤白濁

病狀：小水难出，其色渾濁。古書以为湿熱下注所致。湿勝熱則为白，熱勝湿則为赤。

治法：普通用萆薢分清飲加蒼朮、白朮、黃柏，或用八正散。如中氣虛宜用补中益氣湯。如命門火衰宜用八味丸加兔絲、車前等。

2.楊梅瘡

病狀：先發下疳或魚口，繼而下部生痔，漸至全身。初時大而且硬，其后湿而又爛，小便淋澀，骨節疼痛。

治法：普通用仙遺糧湯（150）或土茯苓湯（151）。如梅毒內結，骨髓疼痛用升麻解毒湯（152），并以鵝黃散（153）外敷瘡面。

3.下疳 橫痃 魚口 便毒

病狀：下疳：龜頭皮緣處，湿爛疼痛。橫痃：生在小腿兩旁或大腿縫中，形如腰子。魚口：生在左膀縫內，形如魚口。便毒：便毒即便癰，又名血疔。生于右腿縫間，無論男女皆有。

治法：黃芪內托湯（154）統治各症。

（十二）傳 染 病

1.感 冒（傷風時症）

病狀：惡風、發熱、頭痛、胃口不好、流涕、咳嗽、嘔

吐或全身俱痛。

治法：輕症用香苏飲（80）或荆防排毒散（157）。重症用防風通聖散（158）。寒季用九味羌活湯。暑季用銀翹散（159）或桑菊飲（160）。

2. 腸 熱（腸伤寒）

病狀：初發惡寒，繼而大熱（其熱能稽留至二、三星期以上），大渴，口唇干燥，頭痛劇烈，舌有白苔，便秘或泄瀉，精神昏迷或發狂譫語，最後溫度下降，舌苔呈暗灰色，大便秘結。如有泄瀉下血，即甚為危險。

治法：近人以腸熱為濕溫，大抵取待期療法，不必拘用三仁湯（236）、一加減正氣散（237）及杏仁薏苡湯（238）等。凡輕瀉可用增液湯（229）、護胃承氣湯（228）；解熱用三黃石膏湯（240）、白虎湯（89）；鎮靜用紫雪丹（226）或安宮牛黃丸（176）；吐衄用犀角地黃湯；下血用白頭翁湯等。視具體狀況，可以參酌採用。張公讓先生云，第二周或第三周末，使用大黃，以黃連、黃芩等清腸消炎之品為助，這與蕭俊逸先生所稱大黃為本病聖藥，可用到熱退為止之語意相似。惟余治此症，常以甘露飲消炎，加味逍遙散、增液湯通便，天王補心丹供末期調養，亦多收效。日人野津猛男專用大小柴胡湯（194）（14），分期看症狀加減，亦是对症療法，臨床時也可參考。

3. 瘧 痧

病狀：初起嘔吐、咽痛、惡寒、發熱、頭痛或痙攣，一兩日後現出鮮紅色之小疹，先發頸部及胸部，次延及全身，再過三、四日，疹子遂褪色或落屑。此症多兼有胸痛及關節疼痛。

治法：略同麻疹。初起用升麻葛根湯（161）。熱甚用治疫清

凉散(162)。重症用化癍湯(163)或清瘟敗毒飲(174)。日久用甘露飲。用俗傳周身扭、括、刺、割、爆各法治之，皆有奇效。

4. 霍 亂

病狀：腹痛、腸鳴、下痢、全身倦怠、胃口不开、四肢却冷、尿量减少、煩渴、抽筋、脉細而微，甚者絞腸出痧，也有現出以上各症，且腹部剧痛。沒有瀉出或只干嘔者，为干性霍乱。

治法：暑天宜用藿香正气湯(164)。寒天宜用胃苓湯。四肢却冷时宜用四逆湯(202)、理中湯。干性霍乱以通为主，宜用枳实導滯丸(165)。口渴、小便不利用竹叶石膏湯(227)加川連、竹茹、蘆根、黄土水等。

5. 痢 疾

病狀：腹痛，里急后重，便有膿血，甚者發热头痛，日久身体衰弱，下利的次数更多；如發热不退，或由瘧疾轉成或噤口惡痢，均系危症。

治法：普通治法是最初用人參排毒散(155)去人參，加粳米。痢疾已成、里急后重，宜用芍藥湯(166)。如小便短澀用芍藥湯加滑石二錢，澤瀉一錢五分。如腹痛用芍藥湯加砂仁一錢。滯澀難出用芍藥湯加當歸、白芍各一錢五分。甚者用芍藥湯加大黃一錢。便多白色用芍藥湯加陳皮、砂仁、茯苓各一錢。便多紅色用芍藥湯加川芎、桃仁各一錢。嘔吐食不下咽用芍藥湯加黑梔、蓮子(去心)各三錢，倉米二錢，入生姜汁少許。热甚宜用白头翁湯(167)。食物不能下咽，宜用倉廩湯(156)。連年累月不止宜用真人養臟湯(168)。身体衰弱过甚宜用四君子湯、六君子湯、四物湯、补中益氣湯之类，各煎湯送下香連丸(40)。多服方能奏效。

6. 瘧 疾

病狀：初則惡寒，繼而發熱，大汗出后，熱退如常時。其病發作有定时，或一日一作，或間日一作，或三日一作。三日一作之症，較為難治。

治法：常法：宜用小柴胡湯去人參，加青皮五分。寒多用小柴胡湯加干姜、桂枝。熱多用小柴胡湯加知母、花粉。久瘧或三陰瘧宜用截瘧七寶飲（169）。虛弱過甚可用八味地黃丸、人參養榮湯等。

7. 鼠 疫

病狀：初起頭目眩暈、咽痛、口干、嘔吐、發熱、惡寒，繼而耳后或頸部、或腋下、或小腹左右側腫大，面紅舌燥，呼吸急促，脈速，神昏譫語。亦有未見核腫而咳血者，其症致命甚速，每不及醫治。

治法：宜用活血解毒湯（170）或清瘟敗毒飲。如咯血即用清燥救肺湯（171）。

8. 流行性腦膜炎

病狀：忽然惡寒發熱，頭痛如劈，項強，四肢麻木，嘔噦交作，旋即神識不清，發狂妄言，脈象勁疾，瞳孔散大。急性症者數小時即死，慢性症者可延至數日，且多會轉為他症而成廢疾者。

治法：初起用腦膜炎初期方（172）。病勢危急用治腦膜炎方（173）或：清瘟敗毒飲。神昏譫語用六神丸（175）、安宮牛黃丸。飲料可用梨汁、荸薺汁、甘蔗汁等。

9. 痘 瘡（俗稱天花）

病狀：初發寒戰，繼而熱甚，頭痛嘔吐，亦有譫語痙攣者。其痘先見面部，次及全身；初成水疱，再變為膿疱，漸致聲嘶，

下咽困难，至十二日后，方能退热結痂。重者于几日后，瘡頂成为臍窩或变成黑色，多不可治。

治法：初起宜用升麻葛根湯。發出时用归宗湯（177）按症加減。身体衰弱，不能發出用保元湯（178）。痘后有眼疾用撥云散（180）。痘后發余毒用忍冬湯（179）。

10. 麻 疹

病狀：初起打噴嚏、咳嗽、流泪、生涕、咽干，繼而發熱不退，耳壳及顏面先出麻点，后乃蔓延于軀干及四肢，重症尙会癰攣，或意識不清，至三、五日后，方能退熱、麻亦消。如疹子發出時，忽而自退，熱度增高，其症甚為危險（古稱麻毒內陷）。

治法：以清金一貫飲（181）按症加減。

附 錄

（一）傷寒症治

中醫治外感病，可以分為兩個大類型，一為傷寒，一為溫病。唐宋以前，治病的方法都照傷寒論，其初起用藥，即以發表瀉下為主。此法對病程短的病症（非稽留性熱病）有迅速解決之妙，但是對病程長的病症（稽留性熱病等）不但不能收效，且恐有害。金元以後，經過醫家不斷研究，才有溫病學說之成立。現將兩種學說列表如下，醫者可根據病的情況，分別採用，不必拘守某一方面的言論，方不致于誤事。

1. 六經病象七言歌（友梅撰約）

六經病症有定章，

頭痛項強屬太陽，

寒热少陽兼利嘔，

陽明胃实又热狂，

太陰腹痛时自利，

下利少陰欲寐常，

更有吐衄气上逆，

厥陰为患实堪伤。

2. 六經症治总表

經 症	病 狀	脉 象	舌 胎	治法
太 陽	头痛、項强、惡寒、發热	浮（在表）	无胎而潤，亦有微白而薄，甚者胎色淡白	發汗
少 陽	口苦、咽干、目眩、寒热往來，亦有痞、痛、利、嘔之症	弦（主半表半里）	偏于半表者，胎白滑；偏于半里者，舌多紅色而胎白，間現雜色	和解
陽 明	身热、目痛、鼻干、不得眠，甚者潮热譫語，手足腋下汗出，腹滿大便秘	大（主实）	舌現正黄	攻下
太 陰	腹滿、吐食自利、不渴、手足溫，有时腹痛	濡（主湿滯、气虛）	舌多灰胎，甚則灰黑	溫补
少 陰	欲寐、惡寒、口中和、腹痛、下利清谷、小便白，亦有內煩外躁不得臥、口中热、下利清水、小便赤	細微（主陰虛、主陽虛）	舌多紅色	滋补
厥 陰	消渴、气逆、心中疼热、飢不欲食、食則吐衄、下之利不止	瀉（主陽虛、化燥）	舌多焦紫，亦有清滑	清涼

3. 太 陽 症 治 表

总候	症别	治法	病态	診 候	用 藥	方数
头痛、項强、惡寒、發热	經 症	汗 法	有汗症	脉緩、自汗、惡風，为虛邪	桂 枝 湯	182
				上病过八九日不解，如瘧狀	桂枝麻黄各半湯	183
				服桂枝湯發大汗后，形如瘧狀，日再發	桂枝二麻黄一湯	184
				脉浮緊、无汗、惡寒，为实邪	麻 黄 湯	185
	腑 症	下 法	无汗症	无汗、煩躁	大 青 龍 湯	186
				干嘔而咳	小 青 龍 湯	13
			膀胱著水 症	口渴、煩躁不得眠、脉浮、小便不利、水入而吐	五 苓 散	51
			膀胱著血 症	病人如狂、小腹硬滿、小便自利、脉沉	桃仁承气湯	187

•

1

1

5. 陽 明 症 治 表

症 別	病 綱	病候綱要	診 候	病 态	用 藥	方数
經 症	身热、目痛、鼻干、不得眠、反恶热	未罢太陽症	兼头 痛、 惡 寒	自 汗	桂 枝 湯	182
				脉 緩 項背强 几几者	桂枝加葛 根 湯	189
				无 汗	麻 黃 湯	185
				脉 浮 項背强 几几者	葛 根 湯	188
		已罢太陽症	无头痛、惡寒	壯热、口渴、即 陽明經本症	白 虎 湯	89
腑 症	潮热、譫語、手足腋下汗出、腹滿、大便秘	太陽陽明	脾 約	因太陽症失治而 轉為陽明，其症 小便数、大便秘	麻 仁 丸	190
		少陽陽明	便 难	因少陽症失治而 轉陽明，为大便 結燥	蜜煎導方	191
					猪胆汁導方	192
		正 陽 明	胃 实	陽气素盛或有宿 食或外邪轉入胃 腑		91
					三承气湯	92 93

附 說

宋元以后的医書，皆謂邪从三陽傳入，俱为热症，惟有下之一法；不从三陽傳入，而徑入三陰之臟，称曰直中，惟有溫之一法。陈修園虽力斥其謬，然其說亦未可厚非也。又近人治太陽經症，冬月以九味羌活湯（67）、夏月以香苏飲（80），來代桂枝（182）、麻黃（185）兩湯，平穩且有奇效。

6. 太 陰 症 治 表

总 候	症別	病 态 及 症 变	用 藥	方数
腹滿、吐食、自便、不渴、手足溫、有时腹痛	邪从陰 化症	自利，食已即吐，有时腹痛，手足溫	理 中 湯	35
		服 前 藥 不 愈 者	四 逆 湯	202
	邪从陽 化症	發汗后， 不解，腹 痛。	大 承 气 湯	92
		腹 滿 时 痛 时 止 大 便 坚 实 而 痛	桂枝加芍藥湯 桂枝加大黃湯	197 198

7. 少 陰 症 治 表

症別	病綱	治 法	診 候	用 藥	方 数
寒 化 症	欲小 寐、白 、惡寒、 脉沉細 且微 、口中和 、腹痛、 下利清谷、	交陰陽法	始伤本当无热而反發热	麻黃附子細辛湯	200
		微發汗法	三日后，无里症，非汗不解， 过汗又恐伤其腎液	麻黃附子甘草湯	201
		用溫劑法	手足厥冷、吐利、小便多、下 利清谷、內寒外热、脉細欲絕	四 逆 湯	202
			里寒外热、面赤或腹痛、或干嘔 或咽痛、利止、脉不出或出而厥	通脉四逆湯	203
			下 利	白 通 湯	207
			利不止、厥逆无脉、干嘔煩	白通加猪胆汁湯	208
			四五日后，腹痛、小便不利、 四肢疼痛、自下利	眞 武 湯	205
			身体痛、手足寒、骨節痛、脉沉	附 子 湯	206
			吐利、手足逆冷、煩躁欲死	吳 茱 萸 湯	30
			少陰病二三日，咽痛者	甘 草 湯	209
			服上藥不愈者	桔 梗 湯	210
			咽中生瘡，不能言語	苦 酒 湯	211
			咽 中 痛	半夏散及湯	212
			下利、咽痛、胸滿、心煩	猪 膚 湯	213
			二三日后，心煩不得臥	黃連阿膠湯	214
			下利六七日，咳而嘔，口渴， 心煩不得眠	猪 苓 湯	52
热 化 症	欲小 寐、赤、 、內煩、 脉沉細 且数 、或不得 臥、口中 热、下利 清水、	補正救 陰 法	二三日至四五日，腹痛、小便 不利、下利、便膿血	桃 花 湯	215
			二三日后，口燥舌干者	小 承 气 湯	91
			六七日后，腹脹不大便	大 承 气 湯	92
			自利清水，色純青，心下痛， 口干燥	調胃承气湯	93
		攻邪救 陰 法			

8. 厥陰症治表

症別	診候	用藥	方數
总病	消渴、气上冲心、心中疼热、飢不欲食、食則吐衄、下之利不止	烏梅丸	216
寒化症	病初起、手足厥冷、脉微	当归四逆湯	217
	脉結代、心下动悸	炙甘草湯	218
热化症	脉滑而厥、泄瀉下重	四逆散	221
	欲飲水数升者	白虎湯	89
	热利下重及利而欲飲水者	白头翁湯	167
積水症	厥而心下悸	茯苓甘草湯	220
	腹中急痛	小建中湯	219
	服前藥不愈者	小柴胡湯	14

附 說

陈修園謂凡小儿驚風之症，皆屬伤寒。但發热者須照太陽治法，因热变症亦同；吐瀉不止者須照太陰治法，慢脾症亦照此治之。惟三陽独取太陽，三陰独取太陰，系喻嘉言用法，能得千古之秘。

9. 伤寒症治五言歌（友梅撰韵）

太陽經症病，头痛而項强，惡寒兼發热，虛实宜細詳。虛者必自汗，主以桂枝湯，过經犹不解，各半用維良，汗后再發热，表散亦无伤，桂枝湯二份，合一份麻黃；若为邪实症，无汗亦惡寒，其脉浮又緊，麻黃湯是餐，憑此再加減，治法非一端，青龍

分大小，咳止并躁安。肺症表不出，邪入于膀胱，蓄水与蓄血，其症本无常，小便苟不利，五苓散是將，桃仁承气下，小腹硬满康。汗下如太过，四逆真武施，承气与白虎，用系因失宜，凡此誤治害，医者要早知。

少陽經症病，寒热常往來，目眩口干苦，虚实各为灾，柴胡湯大小，用之須酌裁。肺症必自利，黃芩湯为宜，夏姜苟加入，嘔吐病亦离，如兼有腹痛，黃連湯不遺，瀉心半夏类，嘔痞症堪医。

陽明經症病，目痛又鼻干，身热反惡热，欲求鼾睡难。太陽若未罢，脉緩必自汗，桂枝湯一方，可以資表散，項背几几然，須加葛以換，脉浮而无汗，麻黃湯最优，項背强益甚，葛根湯可瘳；壯热口又渴，是已罢太陽，通利大小便，宜用白虎湯。倘变为肺症，潮热并譫語，腹满大便硬，汗出莫能拒。如見小便数，系太陽陽明，麻仁丸一服，热症亦可平；若少陽陽明，大便必燥結，胆汁与蜜煎，能專治邪閉；惟正陽明症，系屬胃家实，三种承气湯，能立除斯疾。

太陰病邪化，从陰与从陽，吐利兼腹痛，理中用不妨，如果未見效，即宜四逆湯；痛在發汗后，承气能寬腸，桂枝加芍藥，时痛亦所長，惟有便秘痛，桂須加大黃。

少陰病治法，寒热分兩端，其症但欲寐，辨之殊困难。水白利清谷，口和脉又微，是为寒化症，三种法須知，始伤即發热，治宜交陰陽，溫經兼表散，麻附細辛湯；过后无里症，須用微汗解，麻附甘草方，用之亦最伙；脉微肢又厥，四逆湯是將，通脉四逆类，汗出不解營，若再見下利，即宜用白通，加以猪胆汁，煩躁疾以攻，汗下仍煩躁，茯苓四逆崇，肢痛及自利，真武力最

强，脉沉骨節痛，附子湯不忘，利厥心煩躁，須用吳茱萸。热症脉細数，口热小水清，攻邪与补正，治法須求精。腹脹不大便，口燥并舌干，又有心下痛，須用承气寬；咽痛在初起，桔梗甘草止，半夏与苦酒，其效亦无比，胸滿煩下利，猪膚湯以熬，心煩不得臥，宜黃連阿膠，倘咳嗽嘔吐，猪苓湯是教，大便有膿血，須用桃花調。

兩陰交尽症，其名曰厥陰，虺利身热痛，消渴气冲心，腹飢不欲食，邪热久相侵，主治有耑藥，首推烏梅丸；結代心下悸，炙草湯可餐，当归四逆类；脉微肢厥良，久寒須加味，吳茱萸生姜；热利欲飲水，宜用白头翁，肢厥并泄瀉，四逆散是崇，欲飲水数升，白虎力最雄；腹痛陽脉濇，亟与小建中，服后仍不愈，小柴胡用同，茯苓甘草类，悸厥亦見功。

(二)溫 病 症 治

1.溫 病 七 言 总 歌(友梅撰韵)

不將溫病屬陽明(旧时有人認為溫病屬於伤寒陽明症)，
清代吳瑭論最精(清代吳瑭著溫病条辨，叙述甚詳)。
風暑湿分看症象(他把溫病分为風溫、暑溫 and 湿溫三种)，
上中下別指病程(他又把溫病的过程分为上焦、中焦和下焦三期)。

祛邪最忌汗陽失(溫病忌用發汗藥，恐怕会失汗亡陽)，
扶正須求津液生(溫病要用滋潤藥，以使津液充足)。

治法特殊由經驗，

医家莫事再紛爭。

2. 溫病上焦診治表

类别	病 綱	診 候	用 藥	方数
風溫、 溫熱、 溫疫、	脉不緩不緊而動 數，或兩寸強 大，尺膚熱	初起	熱不惡寒而渴	銀翹散 159
			但咳不熱，微渴	桑菊飲 160
			面赤、惡熱、大汗、脉浮洪、渴甚	白虎湯 89
			口渴、白沫粘滯	五汁飲 223
冬溫类 (或称 太陰溫 病)	頭痛、微惡風寒、 身熱、自汗、口 渴或不渴而咳、 午后熱甚	重	吐血或衄血	犀角地黄湯 85
			舌焦不渴	清營湯 224
			發 斑	化癍湯 163
				清宮湯 225
		症	神昏譫語	紫雪丹 226
			舌蹇語澀	安宮牛黃丸 176
				白虎湯 89
				清暑益氣湯 232
暑 溫 伏暑类	暑溫多手太陰症，形 似傷寒，但右脉洪大 而數，左脉反小，口 渴甚，面赤汗出	同前症	發熱、惡寒、身重疼痛 肢冷、口開、齒燥、自汗 暑溫，汗多、脉數大； 伏暑，舌赤、口渴、汗多	生脉散 233
			神昏、耳聾、目瞑、不 欲言、下之則洞泄	三仁湯 236
濕 溫 寒濕类	頭痛、惡寒、身重 疼痛、舌白、不渴、 脉弦細而濡、面色淡 黃、胸悶、不飢、午 後身熱			

3. 溫病中焦診治表

类别	病 綱	診 候	用 藥	方数
風溫、 溫熱、 溫疫、 溫毒、 冬溫类 (亦称 陽明溫 病类)	面目俱赤、語 聲重濁、呼吸 俱粗、大便閉、 小便瀉、舌苔 老黃(甚則黑) 有芒刺，但日 熱不惡寒、日 晡益甚	脉 洪 而 亢	白虎加人參湯	90
		脉 浮 而 促	減味竹叶石膏湯	227
		身燥、而脉不得、或頭汗、謔 語、不大便	小承氣湯	91
		无汗、小便不利、謔語、不大 便或純利稀水无糞	調胃承氣湯	93
		下后，熱不退、口燥、咽干、 舌干黃或金黃、脉沉而有力	护胃承氣湯	228
		症同上，脉沉而弱	增液湯	229

暑 溫 伏暑类	热久、舌絳苔少	加味清宮湯	234
	热閉、內竅、神識不清	紫雪丹及清宮湯	226 225
湿 溫 寒湿类	脘悶、腹脹、大便不暢	一加减正氣散	237
	風溫寒溫什感混淆、咳嗽、 头脹、不飢、舌白、肢体若廢	杏仁薏苡湯	238

4. 溫 病 下 焦 診 治 表

类 別	診 候	用 藥	方 数
風 溫、 溫 熱、 溫 疫、 溫 毒、 冬 溫 类	身热、面赤、口干、舌燥甚、齒黑 唇裂、或已下或未下、或已下热 不退、或脉結代	加減三甲复脉湯	230
	誤表、舌強、神昏、汗出不止	救 逆 湯	25
	热深、厥深、脉細促、心动	三 甲 复 脉 湯	231
暑溫伏暑类	热久、寢食不安或神識不清	三 才 湯	235
湿溫寒湿类	神昏竅阻、小腹硬滿、大便不下	宣 清 導 濁 湯	239

5. 風 溫 五 言 歌

風溫即溫熱，溫疫冬溫同，發熱不惡寒，銀翹散是崇，如咳
有微渴，桑菊有奇功，汗出渴惡熱，須用白虎湯；重症口粘滯，
五汁亦无妨，兼有吐与衄，宜犀角地黃，舌焦或斑出，清營化癰
良，若現神昏症，清宮紫雪長，更有牛黃丸，鎮攝力尤強。中焦
脉洪芤，白虎加人參，舌黃面目赤，竹叶石膏堪，謔妄脉不浮，
小承氣以探，秘瀉或干燥，調护是指南，更有增液湯，潤腸味頗
甘，此等輕瀉藥，治溫要細談。下焦脉結代，复脉用无疑，神昏
汗又出，救逆莫延迟，厥悸脉細促，三甲是良規。

6. 暑 溫 五 言 歌

暑溫与伏暑，上焦汗渴憂，白虎及清暑，生脉各須求，清宮

湯加味，熱久不為愁，神昏內竅閉，須用紫雪流，傳及于下焦，神識多不清，惟有三才湯，兩補可回生。

7. 濕溫五言歌

濕溫寒濕害，身重熱不飢，上焦三仁湯，目瞋耳聾宜，如傳及中焦，脘悶腹脹時，正氣一加減，整便有專司，杏仁薏苡類，能起若廢肢，竅阻便不下，下焦症可危，宜清導濁方，服下可支持。

第三章 藥方歌訣

(1) 四君子湯 (治虛弱、泄瀉等)

(2) 六君子湯 (治虛弱、氣喘、反胃、久呃、久泄等)

(3) 香砂六君子湯 (治腹痛、脹滿等)

(4) 加味六君子湯 (治中風)

夏陳參朮苓甘同，加入香砂痞滿通，

若益竹姜麥附子，方名加味善驅風。

人參、白朮、茯苓各二錢，甘草(炙)一錢，加姜棗煎，名四君子湯；若再加陳皮、半夏各一錢，名六君子湯。六君子湯再加木香、砂仁各八分，名香砂六君子湯；加麥冬三錢，附子一錢，竹瀝五分，生姜汁二錢，名加味六君子湯。

(5) 歸脾湯 (治虛弱、怔忡、月經病等)

歸脾湯內朮耆神，參志香甘與棗仁，

龍眼當歸十味外，若加熟地失其真。

炙黃耆三錢，人參、白朮(蒸)、棗仁(炒黑)、當歸、茯神、龍眼肉各二錢，木香五分，炙草一錢，遠志(去心)五分，

水煎服。加熟地者为黑归脾湯。

(6) 六味丸 (治虛弱、气喘、眩暈、头痛等)

(7) 八味丸 (治虛弱、脚气、陽痿、赤白濁、久瘡等)

六味滋陰益腎肝，茱萸丹澤地苓丸，

再加桂附扶心火，八味功同九轉丹。

熟地八兩，山萸肉、淮山藥各四兩，丹皮、澤瀉、茯苓各三兩，制丸，即為六味丸；藥量改“兩”為“錢”（即改一兩為一錢），水煎，名六味地黃湯。六味丸加附子、肉桂各一兩，制丸，名八味地黃丸；若藥量改“兩”為“錢”，水煎，即為八味地黃湯。

(8) 當歸六黃湯 (治虛弱、盜汗等)

身虛汗出六黃湯，二地苓連柏與當，

倍用黃耆偏走表，苦堅妙用斂浮陽。

生地黃、熟地黃、黃柏、黃芩、黃連、當歸各等分，黃耆加倍。

(9) 人參養榮湯 (治虛弱、汗症、久瘡等)

(10) 十全大補丸 (治風濕病、遺精、月經病、瘡瘍等)

桂耆加入八珍煎，大補功宏號十全，

再益志陳五味子，去芎辛竄養榮專。

人參、白朮、茯苓、甘草名四君子湯。川芎、當歸、熟地、白芍名四物湯。四君子湯方合四物湯方名八珍丸；再加肉桂、黃耆名十全大補丸。十全大補丸去川芎，加遠志、陳皮、五味子名人參養榮湯。用量可隨症酌定。

(11) 七味鴨 (治虛損、咳嗽、痰喘等)

鴨煎七味用維宏，白朮歸中地熟生，

貝母茯神除痰嗽，骨皮瀉火有奇能。

生地、熟地、归中、茯神、白朮各三錢，川貝二錢，地骨四錢，老鴨一只，加陳酒煮服。

(12) 六安煎 (治傷風咳嗽)

六安芥杏合二陳，咳嗽風寒惟此珍，
去芥特加姜細味，莫因身熱棄溫辛。

即二陳湯加杏仁（去尖）二錢、白芥子（研炒）一錢，或去白芥子，加干姜、細辛、五味子，水煎服。

(13) 小青龍湯 (治咳嗽多痰)

小青龍湯治水氣，姜桂夏芍甘辛味，
喘咳嘔嘔渴利憂，先煎麻黃去頭沸。

麻黃、桂枝、芍藥、炙草各二錢，半夏一錢五分，五味子、細辛各一錢，先煎麻黃去沫，後入諸藥煎服。

(14) 小柴胡湯 (治咳嗽、癰疾等)

小柴和解著良方，半夏人參姜棗同，
益以黃芩兼甘草，少陽百病此為崇。

柴胡四錢，人參、黃芩、炙草、生姜各一錢五分，半夏二錢，大棗二枚，水煎服。

(15) 麥門冬湯 (治咳嗽帶血)

麥冬湯內用桑茹，桔夏地麻味苑儲，
姜草合成十一味，血咳病後總能除。

麥冬（去心）二錢，桔梗、桑根皮、半夏、生地黄、紫苑茸、竹茹各一錢，麻黃七分，炙草五分，五味子十粒，生姜一片，煎服。

(16) 五味子湯 (治咳血)

五味子湯本千金，桑茹苑斷地黃尋，

增來桔草同小豆，咳血內傷效可欽。

五味子(研)五分，桔梗、甘草、紫苑、續斷、竹茹、桑根皮各一錢，生地二錢，赤小豆一撮，水煎服。

(17) 葶藶大棗瀉肺湯(治气喘)

葶藶子(隔紙炒，研如泥)半錢，大棗十二枚，煎服。

(18) 黑錫丹(治气喘、眩暈、頭痛等)

止喘方推黑錫丹，硫黃入錫結成团，

胡蘆故紙茴沉木，桂附金鈴肉蔻丸。

沉香、附子(炮)、胡蘆巴、肉桂各五錢，小茴香、補骨脂(即故紙)、肉豆蔻、木香、金鈴子(去核)各一兩，硫黃、黑錫(与硫黃炒成細粒)各三兩，共为丸，每服五分。

(19) 苏子降氣湯(治暴發气喘症)

降氣湯中苏半归，橘煎沉朴草姜依，

風寒咳嗽痰涎喘，暴病无妨任指揮。

紫苏子(微炒)二錢，前胡、当归、半夏、陈皮、厚朴各一錢，沉香、炙草各五分，加姜棗煎服。

(20) 五積散(治全身各部疼痛、風湿病等)

局方五積散神奇，归芍参芎用更奇，

桔芷夏苓姜桂草，麻蒼枳朴与陈皮。

当归、蒼朮、麻黃、陈皮各一錢，厚朴、干姜、芍藥、枳壳各八分，半夏、白芷各七分，桔梗、炙草、茯苓、肉桂、人參各五分，川芎四分，姜三片，葱白三根，水煎服。

(21) 天王补心丹(治心跳、牙舌痛)

天王遺下补心丹，为憫山僧講課難，

归地二冬酸柏远，三参苓桔味为丸。

生地黃四兩，酸棗仁、當歸、柏子仁、麥門冬、天門冬、五味子各一兩，白茯苓、遠志、人參、丹參、元參、桔梗各五錢，共研末，煉蜜為丸，金箔為衣。每服三錢，臨睡前用燈心紅棗湯送下。

(22) 加味百合湯 (治心痛)

百合加味腹桑陳，赤茯苓荅麥珍，

蘇葉兜蕪草枳貝，再加薤薤拯苦辛。

百合、腹皮、桑白皮、陳皮、赤茯苓、猪苓、人參、麥冬、甘草、枳殼、蘇梗各三錢，兜連七枚，再酌加薤白、川貝、豆蔻、薤白等四味，研為末，每服四錢，開水送下。

(23) 都氣丸 (治怔忡)

即六味丸加五味子。

(24) 復脈湯 (治怔忡脈結代)

(25) 救逆湯 (治怔忡不寐)

復脈原來本炙甘，麥冬地芍膠麻參，

麻仁不用加龍牡，鎮攝真陰救逆堪。

復脈湯即炙甘草湯加減：炙甘草、干地黃、白芍各六錢，連心麥冬五錢，阿膠、火麻仁各三錢。本方去麻仁，加龍骨、生牡蠣八錢，即名救逆湯。

(26) 濟生腎氣丸 (治陰閉和慢性水腫等)

腎氣丸名別濟生，車牛八味合而成，

膚膨腹腫爽如壅，氣化網縕水自行。

熟地四兩，茯苓、山藥、山茱各二兩，丹皮、澤瀉各一兩五錢，車前、牛膝各一兩，肉桂、附子各五錢，蜜丸，空腹米湯送下。

此方即是八味丸加車前、牛膝。

(27) 平胃散 (治胃痛、脹滿、傷食積聚等)

(28) 四苓散 (治泄瀉)

(29) 胃苓散 (治泄瀉、水腫、吐瀉等)

甘蒼厚朴与陈皮，平胃寬胸用最宜，

澤朮茯苓四苓散，合剂消腫效无疑。

蒼朮、厚朴(炒)、陈皮各二錢，甘草一錢，加姜煎服，名平胃散；加白朮、澤瀉、猪苓各一錢五分，茯苓四錢，即为四苓湯。平胃散和四苓湯兩方合剂，即名胃苓湯。

(30) 吳茱萸湯 (治胃痛、反胃、嘔吐等)

陽明吐谷喜茱萸，姜棗人参却并驅，

吐利燥煩手足冷，多涎頭痛立功殊。

吳茱萸(湯泡)三錢，人参一錢五分，大棗四枚，生姜六錢，水煎服。

(31) 二陳湯 (治胃痛、嘔吐、咳嗽等)

(32) 導痰湯 (治中風輕症)

(33) 滌痰湯 (治中風痰涌)

二陈苓草夏和陈，更有導痰星枳珍，

再益菖茹与黨党，滌痰降逆效如神。

陈皮一錢五分，半夏、茯苓各三錢，炙草一錢，加姜煮，名二陈湯；加枳实、南星，名導痰湯；導痰湯再加党参、菖蒲、竹茹，名滌痰湯。

(34) 金鈴子散 (治痼痛)

金鈴子散妙如神，須辨諸疹作止頻，

胡索金鈴調酒服，制方原是远溫辛。

金鈴子(去核)、元胡索各二兩，研为末，每服三錢，用黃

酒送下。

(35) 理中丸及湯 (治胃痛、腹痛、反胃、吐瀉等)

理中湯主理中鄉，甘草人參朮与姜，

嘔利陰寒腹痛甚，或加桂附总扶陽。

人參、白朮、甘草、干姜各三兩，共研末，蜜为丸，如鷄蛋黃大，每服一丸（研碎），日服三次，服后啜热粥，以腸热为度。

(36) 附子粳米湯 (治腹痛)

粳米特調附子湯，棗甘半夏合成方，

腹寒切痛兼嘔吐，日夜煎來三服康。

附子（制）二錢，半夏四分，炙草一錢，粳米（布包）五錢，大棗二枚，水煎服。

(37) 厚朴三物湯 (治腹痛脹滿)

(38) 厚朴七物湯 (治腹痛脹滿有热)

厚朴古傳三物湯，大黃枳实合成方，

增來桂草加姜棗，七物命名邪热匡。

厚朴三物湯：厚朴四錢，大黃三錢，枳实一錢五分。厚朴七物湯：即厚朴三物湯加桂枝、甘草、生姜各一錢五分，大棗三枚。水煎服。

(39) 茱連丸 (治胃痛酸多)

(40) 香連丸 (治久痢)

茱連六一左金丸，肝郁脅疼并吐酸，

更有痢門通用剂，香連九子保康安。

黃連六兩，吳茱萸（鹽湯泡）一兩，研末为丸，名茱連丸。
如用黃連二十兩（和吳茱萸十兩、水拌浸一宿，同炒，去吳

茱萸)，木香四兩五錢八分，合研为末，糊丸，为香連丸。每服二、三錢，空腹米湯送下。

(41) 左归飲 (治膈食虛症)

左归飲內用地荅，杞草同煎效更灵，
再益茱萸滋腎水，胃陰开展隔堪宁。

此方即六味丸去丹皮、澤瀉，加枸杞、炙草，水煎服。

(42) 啓膈飲 (治膈食)

心悟曾傳啓膈方，沙丹荷蒂杵头糠，
郁金荅貝砂仁壳，宣導石蒲更不忘。

川貝母一錢五分 (切片，不研末)，沙參三錢，丹參二錢，川郁金五分，干荷蒂三个，砂仁壳四分，杵头糠 (即杵头附着之米糠) 二錢 (布包)，茯苓一錢五分，石菖蒲四分，水煎服。

(43) 枳朮湯 (治蠱脹)

枳实二錢，白朮四錢。一日三服，至腹軟为止。

(44) 进退黃連湯 (治嘔吐哕)

黃連湯本伤寒方，進法合將原剂嘗，
不用桂枝連減半，再加肉桂退須詳。

黃連、炙草、干姜、人參、半夏各一錢五分，桂枝一錢，大棗二枚。進法用本方七味 (俱生用，不必制)，水煎溫服；退法不用桂枝 (或用五分)，黃連減半，加肉桂，逐味制熟 (黃連、半夏各用姜汁炒，甘草用蜜炙，干姜炮，人參用人乳拌蒸)，服法同前。

(45) 代赭旋复湯 (治痞癰、噎气等)

代赭旋复用人參，半夏甘姜大棗臨，

重以鎮逆鹹軟痞，痞鞭噫气力能禁。

赭石一兩，人參二兩，旋復花、甘草各三兩，半夏半斤，
生姜五兩，棗十二枚，水煎服。

(46) 四神丸 (治五更瀉)

四神故紙與吳茱，肉蔻除油五味俱，

大棗須同姜煮爛，五更腎瀉火衰扶。

破故紙四兩 (酒浸炒)，吳茱萸一兩 (鹽少炒)，肉豆
蔻二兩 (麩里煨)，五味子三兩，大紅棗四十九枚，加生姜
四兩，同煮至紅棗爛，去姜共搗為丸，臨睡前鹽湯送下，不
宜早服。

(47) 半夏瀉心湯 (治五更瀉及痞滿等)

煎來半夏瀉心湯，痞滿何憂勢猖狂，

姜棗參苓連甘草，疏通膠滯保健康。

半夏三錢，黃芩、干姜、炙草、人參各一錢五分，黃連
五分，大棗二枚，水煎服。

(48) 黃連湯 (治五更瀉及嘔吐等)

黃連湯內用干姜，半夏人參甘草嘗，

更用桂枝兼大棗，熱寒嘔痛用維常。

黃連、炙草、干姜、桂枝各一錢五分，人參一錢，半夏二
錢，大棗二枚，水煎服。

(49) 黃芩湯 (治呃逆、五更瀉等)

(50) 黃芩加半夏生姜湯 (治下痢、嘔吐等)

黃芩湯用芍甘草，太陽少陰合病討，

下痢只須用本方，并嘔姜夏加之好。

黃芩三錢，炙草、芍藥各二錢，大棗三枚，酌加半夏、生

姜，水煎服。

(51) 五苓散 (治水瀉)

(52) 猪苓散 (治黄疽、小便不利等)

桂枝朮澤猪茯苓，散号五苓气化行，

桂朮捐除加膠滑，疽黃便閉自堪宁。

澤瀉二兩，猪苓、白朮、茯苓各一兩，桂枝七錢，名为五苓散，共为末，每服三錢，开水送下。五苓散去白朮、桂枝，加阿膠、滑石，为猪苓散（即猪苓、茯苓、阿膠、澤瀉、滑石各三錢）。研为末，服法同前。

(53) 三層茴香丸 (治疝气)

茴香丸用有三層，川棟沙香投最先，

榔撥加成第二料，茯苓炮附末方煎。

大茴香五錢（同鹽五錢共炒），川棟子、沙參、木香各一兩，研为末，米糊丸，如桐子大，每服三錢，空心溫酒送下，服尽。第二料照前方加畢撥三錢、檳榔二錢，依前法服尽。若未愈再服第三料，即照前第二料加茯苓四兩、附子（炒）一兩（共八味），服法如前。

(54) 千金翼洗方 (治疝气外用方)

千金翼內有洗方，礬石为君佐雄黃，

甘草同煎能解毒，大凡疝痛总难忘。

雄黃末一兩，礬石二兩，甘草七錢，水五杯煎至兩杯，洗之。

(55) 五皮飲 (治水腫初症)

五皮飲用五般皮，陈茯姜桑大腹宜，

或用五加易桑白，脾虛膚脹此方施。

大腹皮（酒洗），生桑白皮（用五加皮亦可）、陈皮各二錢，茯苓皮四錢，生姜皮一錢，水煎服。

（56）玉屏風散（治汗症）

玉屏風散主諸風，止汗先求繫繫通，

發在著防收在朮，熱除濕去主中宮。

防風、黃耆、白朮各等分，研為末，調水服。

（57）八正散（治癃閉、赤白濁等）

八正散方通與前，大黃篇蓄生梔研，

草梢瞿麥兼滑石，燈草同煎淋痛蠲。

木通、燈心草、瞿麥、車前、梔子、篇蓄、大黃、滑石、甘草梢各一斤，研為末，每次服兩三錢。

（58）滋腎丸（治癃閉）

溺癃不渴下焦疏，知柏應同肉桂扶，

丸號通關能利水，又名滋腎補陰虛。

黃柏、知母（俱酒炒）各二兩，肉桂二錢，煉蜜為丸，如桐子大，每服五十丸，空腹用白湯送下。

（59）小續命湯（治中風通用）

小續命湯桂附芎，麻黃參芍杏防風，

黃芩防己兼甘草，風中諸經以此通。

防風一錢，桂枝、麻黃（去節根）、人參、酒芍、杏仁、川芎、黃芩、防己、甘草各八分，附子四分，姜棗合煎服。

（60）三化湯（治中風大便不通）

三化湯中羌枳黃，熱風中臟有奇長，

須知開里寒涼品，大便疏通病自良。

大黃、枳殼、羌活各二錢，水煎服。

(61) 稀涎散 (治中風痰涌昏迷)

稀涎巴豆皂礬班，直中痰潮此斬关，

加入灯心冲溫水，如当初病保生还。

巴豆六枚（每枚切成兩片），牙皂三錢（切），明礬一兩，研为末，每次用三分吹入喉中。痰盛者，調灯心湯五分送下。

(62) 參附湯 (治中風暴脫四肢冷)

人參一兩，附子五錢。

(63) 薑附湯 (治中風虛脫汗出)

黃薑一兩，附子五錢。

(64) 归附湯 (治中風脫症身痛)

当归一兩，附子五錢。

(65) 朮附湯 (治中風泄瀉脫症)

白朮一兩，附子五錢。

(66) 資壽解語湯 (治中風不語)

資壽特名解語湯，專需竹瀝佐些姜，

羌防桂附羚羊角，酸棗麻甘十味詳。

防風、附子、天麻、棗仁各一錢，羚羊角、肉桂各八分，羌活、甘草各五分，水兩杯，煎八分，入竹瀝五錢，姜汁二錢五分服下。

(67) 九味羌活湯 (治感冒眩暈頭痛)

冲和湯內用防風，羌活辛蒼草芷芎，

汗本于陰苓地妙，三陽解表一方通。

羌活、防風、蒼朮各一錢五分，白芷、川芎、黃芩、生地、甘草各二錢，細辛五分，加生姜、葱白煎服。

(68) 一味大黃散 (治眩暈頭痛实证)

酒炒大黃三錢，研末，用茶送下。

(69) 补中益氣湯 (治一切衰弱久病)

补中参草朮归陈，耆得升柴用更神，

劳倦内伤功独擅，陽虛外感亦堪珍。

黃耆一錢五分，人參、白朮(炒)、当归各一錢，炙草、陈皮各五分，升麻、柴胡各三分，加姜棗煎服。

(70) 防眩湯 (治眩暈頭痛虛症)

防眩一藥有天麻，地芍芎归参朮加，

萸肉再同陈夏煮，体衰多服效堪誇。

党参、半夏各三錢，白朮、当归、白芍、熟地各一兩，陈皮、川芎、萸肉各五錢，天麻一錢，水煎服。

(71) 头風藥 (治眩暈頭痛)

偏正头風白芷君，天麻芎草共为群，

川烏生熟宜参半，茶叶木荷少許存。

白芷二兩五錢，川芎、甘草、川烏(生熟各半)、天麻各一兩，研末，每服一錢，食后用細茶叶和木荷煎湯送下。

(72) 溫胆湯 (治癰病輕劑)

溫胆湯方本二陈，竹茹枳实合为珍，

不眠驚悸虛煩嘔，日暖風和木气伸。

即二陈湯加竹茹、枳实各二錢，水煎服。

(73) 磁砂丸 (治癰病通劑)

磁砂丸最靖陰陽，神朮能裨谷气昌，

內障黑花聾并治，若医癰痼有奇長。

磁石二兩，硃砂一兩，神朮三兩，煉蜜为丸，每次服兩三

錢，开水送下。

(74) 礞石滾痰丸 (治狂疾)

隱君遺下滾痰方，礞石黃芩及大黃，

少佐沉香為引導，頑痰怪症力能匡。

青礞石二兩（研如米大）同焰硝三兩，裝入新磁罐內封固，以鐵綫扎之，外再用鹽泥封固，煨過取水飛過三兩研末，為丸，如綠豆大，每服二、三錢。實重者加沉香一兩（另研），大黃（酒蒸）、黃芩（炒）各三兩。

(75) 生鐵落飲 (治狂疾)

鐵落飲內用石膏，龍齒茯苓防芎曹，

再益黑參除上熱，制裁狂妄此為豪。

鐵落一盞（用水六杯煮取三杯），和石膏一兩，龍齒、茯苓、防風各七分，黑參、秦艽各五分合煎，煎至一杯服下，日服兩次。

(76) 當歸龍薈丸 (治癰病熱甚)

當歸龍薈黛梔藏，木麝二陳及四黃，

龍胆合成十一味，肝經實火總能防。

當歸、龍胆草、梔子仁、黃柏、黃連、黃芩各一兩，大黃、蘆薈、青黛各五錢，木香一錢五分，麝香五分，共研為末（麝香另研），和神糲糊丸，每服二十丸，姜湯送下。

(77) 丹礬丸 (治癰病)

黃丹一兩，白礬二兩，裝入銀罐中，煨紅後，研為末，入臘茶一兩，和不落水的豬心血為丸，以硃砂為衣，每服兩三錢，清茶送下。

(78) 雞鳴散 (治腳氣)

鷄鳴散是絕奇方，苏叶吳茱萸梗姜，

瓜橘枳榔煎冷服，脛浮脚气效彰彰。

枳榔七枚，橘紅、木瓜各一兩，吳茱萸、苏叶各三錢，
桔梗、生姜各五錢，加水三碗煎至碗半，取汁，渣再入水三
碗，煎至一碗，然后兩汁相和，五更时，分三、五次冷服，
冬天可溫服。

(79) 四生飲 (治血症輕病)

四生飲用叶三般，艾柏鮮荷生地班，

共搗成团入水化，血随火降一时还。

生側柏叶、生艾叶、生荷叶、生地黃各等分，煎服。

(80) 香苏飲 (治感冒及妇人經期感冒)

香苏飲內草陈皮，汗願陰陽用頗奇，

加入姜葱为引導，諸凡感冒总堪医。

紫苏叶二錢，香附(炒)、陈皮各一錢五分，炙草一錢，加
姜葱，水煎服。服藥后，盖被休息，使出汗。

(81) 柏葉湯 (治血症重病)

柏叶湯中艾与姜，須同童便合共營，

大凡血吐如难止，服此方知方藥良。

柏叶(生用)三錢(无生的用干的二錢)，干姜一錢，艾叶
(生用)二錢(无生的用干的一錢)，童便一大杯，水煎服。

(82) 甘露飲 (治吐衄血、癰瘡等)

甘露二冬二地参，枇甘苓枳斛茵陈，

齷糜口爛吐兼衄，虛热消除效若神。

天冬、麥冬、生地、熟地、黃芩、枳壳、枇杷叶、石斛、茵
陈、甘草各等分，煎湯服。

(83) 当归补血湯 (治血症、臨產禁水過多等)

血虛身熱有奇方，古用當歸補血湯，

四倍黃芪歸一分，輕清微汗奏殊功。

當歸二錢五分，黃芪（炙）一兩，水煎服。

(84) 龍牡地黃榴梅丸 (治血崩重症)

血崩症候實堪驚，龍牡地淮膠墨呈，

再益榴梅棕百草，糊丸調醋妙難名。

生地（炒）一兩，龍骨（煨研末）、牡蠣（煨）各四錢，陳京墨（炒）、石榴皮（炒）、烏梅肉（炒）、陳棕皮、百草霜各三錢，阿膠（蒲黃炒）六錢，淮山五錢，共研末，醋水合糊為丸，人參湯送下。

(85) 犀角地黃湯 (治一切血症)

犀角地黃芍藥丹，血升胃熱火邪干，

斑黃湯毒皆堪治，或益柴苓總伐肝。

生地六錢，白芍四錢，牡丹皮三錢，犀角二錢（磨汁或研末），水煎服。

(86) 獨活寄生湯 (治風濕病)

獨活寄生參草苓，芎歸地芍杜牛煎，

羌辛再合桂心養，風濕偏枯壽可延。

獨活二錢，寄生、人參、甘草、茯苓、川芎、歸身、生地、白芍、杜仲、牛膝、秦艽、細辛、桂心各一錢，水煎服。

(87) 茵陳蒿湯 (治黃疸要方)

古有茵陳治疸方，陰陽寒熱細推詳，

陽黃梔子大黃入，明附陰黃共北姜。

以茵陳為主（可用三、五錢），陽黃加大黃、梔子，陰黃加

干姜、附子，水煎服。

(88) 七味丸 (治消渴)

亦名加減八味丸。即六味丸加肉桂，或再加五味子，為丸，服法同八味丸。

(89) 白虎湯 (治高熱、大渴、大汗等)

(90) 白虎加人參湯 (治消渴)

白虎知甘米石膏，陽明大渴汗滔滔，

加參補氣生津液，熱迫亡陽此最高。

石膏 (用碎棉裹之) 八錢，知母三錢，炙草一錢，粳米四錢，為白虎湯；加人參一錢，即白虎加人參湯。各以水煎服。

(91) 小承氣湯 (治熱病大便不通之輕劑)

(92) 大承氣湯 (治熱病大便不通之重劑)

(93) 調胃承氣湯 (治熱病之和緩通便藥)

小承氣湯朴枳黃，加硝大劑力增強，

硝黃若用同甘草，調胃還成和緩方。

大黃四錢，枳實、川朴各二錢，為小承氣湯。川朴四錢，大黃、枳實、芒硝各二錢，為大承氣湯。大黃四錢，芒硝、炙草各三錢，為調胃承氣湯。各以水煎服。

(94) 腎氣丸 (治消渴小便多及寒性水腫等)

熟地四錢，淮山藥、山萸肉各二錢，白茯苓、牡丹皮、澤瀉各一錢五分，水煎服。此即金匱腎氣丸，藥味同八味丸。

(95) 還少丹 (治陽痿)

楊氏傳來還少丹，萊菔苓地杜牛餐，

菴蓉楮實茴巴枸，遠志菖蒲味棗丸。

山萸肉、淮山藥、茯苓、熟地黃、杜仲、牛膝、肉菴蓉、楮

实子、小茴香、巴戟天、枸杞（去骨）、远志、石菖蒲（去骨）、五味子各二兩，紅棗（煮后去皮核）百粒，煉蜜为丸，如梧子大，每服三錢，淡鹽湯送服，一日兩服。

（96）**龙胆瀉肝湯**（治遺精、眼耳病）

龍胆瀉肝通澤柴，車前生地草归偕，

梔苓一派清凉品，湿熱肝邪力可排。

梔子、黃芩、澤瀉、柴胡各一錢，車前、木通各五分，胆草、当归、甘草、生地各三分，水煎服。

（97）**封髓丹**（治遺精）

妄夢遺精封髓丹，砂仁黃柏草和丸，

庸人莫笑偏寒品，瀉火应同补攝觀。

砂仁一兩，黃柏三兩，炙草七錢，煉蜜为丸，每服三錢，淡鹽湯送下。

（98）**五淋湯**（治淋病）

五淋湯用草梔仁，归芍茯苓亦共珍，

气化原由陰以育，調行水道妙通神。

赤茯苓三錢，白芍、山梔各二錢，当归、甘草各一錢四分，加灯心，水煎服。

（99）**草薢分清飲**（治淋病、赤白濁等）

草薢分清主石薢，草梢烏藥智仁俱，

煎时又入鹽些少，淋濁流連數服驅。

烏藥、益智仁、石菖蒲、草薢各等分，甘草梢減半，加鹽少許，水煎服。

（100）**逍遙散**（治月經病、帶下、癰瘰、耳病等）

（101）**加味逍遙散**（治月經病、帶下、癰瘰、耳病等）

逍遙散用芍當歸，朮草柴苓慎勿違，

散郁除蒸功最捷，丹梔加入有元机。

柴胡、當歸、白芍、白朮、茯苓各一錢，炙草五分，加煨姜、木荷共煎，為逍遙散。若再加丹皮、梔子，名加味逍遙散。此藥善通經，為散郁專藥。

(102) 四物湯 (治脚氣、月經病、貧血，加減藥味可治婦科各病)

(103) 八珍丸 (治貧血、神經衰弱及婦人經期各病)

(104) 荊芥四物湯 (治崩漏)

(105) 膠艾四物湯 (治崩漏)

(106) 回乳四物湯 (治乳積腫痛)

四物芍歸地芍成，四君配合是八珍，

漏崩加芥或膠艾，回乳麥芽用最神。

熟地、白芍、川芎各二錢，當歸一錢五分，為四物湯，加四君，為八珍丸。四物湯加荊芥，為荊芥四物湯。四物湯加阿膠、艾葉，為膠艾四物湯。四物湯加麥芽一兩，即回乳四物湯。研末，食遠服。

(107) 威喜丸 (治帶下)

和濟傳來威喜丸，夢遺滯濁服之安，

茯苓煑晒和黃蜡，專治陽虛血海寒。

白茯苓(去皮)四兩，猪苓四錢五分，裝入磁器內，煮二十余沸，去猪苓，取出茯苓晒干并研為末，和黃蜡四兩(加熱熔化)為丸，如彈子大，空腹細嚼徐咽，每次服四、五錢。

(108) 保產無憂方 (胎前各病通治藥)

無憂散用芍歸芎，羌芥母絲枳朴沖，

艾暖子宮芪扶氣，再加姜草妙無窮。

当归(酒洗)一錢五分,川貝母一錢,黃芪(生用)、荊芥各八分,艾叶九分,川芎、白芍(酒炒)各一錢二分(白芍冬天用一錢),兔絲子四錢,厚朴(姜汁炒)七分,枳壳六分,羌活、甘草各五分,加姜棗煎服。

(109)惡阻方(治胎前嘔吐)

惡阻驗方參朮甘,陳砂香附烏梅餐,

婦人有孕如嘔吐,服此不难頃刻安。

黨參、砂仁、甘草各一錢,白朮、香附、烏梅、陳皮各一錢五分,以姜為引,水煎,飯後服。

(110)胎漏方(治胎前漏血)

胎漏當歸赤芍煎,朮參熟地柏苓研,

炙甘膠艾同知母,姜棗合調病自痊。

當歸、赤芍、白朮、黨參、熟地、黃柏、黃芩、炙草、阿膠、艾叶、知母各等分,姜棗為引,水煎,食遠服。

(111)千金保孕丸(預防流產藥)

千金保孕有殊功,杜仲淮山續斷同,

小產婦人成習慣,糊丸多服效堪崇。

杜仲(糯米炒)四兩,續斷二兩,淮山六兩,糊丸,如胡椒大,每服八、九十丸,空腹用米湯送下。

(112)加味芎歸湯(臨產催生用藥)

芎歸加味便催生,龜板能將胎氣行,

再益髮灰消瘀血,陰虛骨閉用維宏。

龜板(生研)、川芎各三錢,歸身五錢,婦人產後頭髮一撮,水煎服。若難產,當歸量加多,并再加黃芪五錢、牛膝三錢。

(113)失笑散(治胞衣不下)

失笑蒲黃及五灵，暈平痛止積无停，

醋湯共末一齐下，每服三錢病自宁。

五灵脂（醋炒）、蒲黃各一兩，共研末，每服三錢，醋湯送下。

（114）生化湯（產后各病通治藥）

生化湯中归力雄，桃仁錢半二錢芎，

煨姜加入炙甘草，產后行瘀用不窮。

干姜（炮）、当归各五錢，川芎二錢，桃仁（去皮尖）一錢五分，炙草一錢，水煎服。若中風口禁，角弓反張，加荆芥三錢。

（115）竹叶湯（治產后受風痙攣）

喘熱頭疼面正紅，桔防桂草与參同，

葛根加入炮附子，姜棗助成竹叶功。

鮮竹叶四十九片，葛根三錢，防風、桔梗、桂枝、人參、附子（炮）、甘草各一錢，大棗五枚，生姜半兩，水煎服。服藥后，溫復使出汗，日夜服三劑。

（116）加味四物湯（治乳汁不通）

生地芎归赤芍同，婦人乳汁此堪通，

麥冬白芷參甘桔，調炖猪蹄立見功。

归中、川芎、赤芍、生地、麥冬、白芷、党參、桔梗、甘草各一錢，水煎，食远服。若能調猪蹄湯服最好。

（117）荊防牛蒡湯（治乳痛發熱）

荊防湯剂合牛蒡，花粉銀翹皂刺行，

香附陈皮芩甘草，公英加入外吹良。

荊芥、防風、牛蒡、銀花、陈皮、花粉、黃芩、公英、連

翹、皂刺各二錢，香附、甘草各五分。食远服。

(118) 柴胡清肝湯 (治鬚疽、脅疽、腋癰等，乳內吹亦可用)

清肝湯內用柴胡，地芍芎歸在必需，

花粉黃芩同梔子，翹防莠草立功殊。

柴胡、生地、赤芍、牛蒡各一錢五分，當歸、連翹各二錢，川芎、黃芩、山梔、花粉、防風、甘草節各一錢，水煎，食远服。

(119) 清熱瀉脾湯 (治鵝口)

清熱瀉脾治鵝口，石膏生地赤苓養，

苓連梔子合成劑，加入燈心病即愈。

赤茯苓、山梔(炒)各二錢，石膏八錢，黃連(姜炒)一錢，生地三錢，黃芩一錢五分，用燈心為引，水煎服。

(120) 龍胆湯 (治噤口、撮口、脾風等)

龍胆湯方首柴苓，鉤藤赤芍大黃尋，

螻蛄梗草同赤茯，噤撮嬰孩病不侵。

柴胡、黃芩、龍胆、桔梗各一錢五分，赤芍、大黃各二錢，鉤藤、螻蛄、甘草各一錢，水煎服。

(121) 驅風散 (治脾風)

驅風散可療脾風，枳朴蘇防甘草同，

再用蜚蠊調廣木，陳皮加入有奇功。

枳殼、川朴、蘇葉、防風、陳皮各一錢，僵蚕、鉤藤、廣木香、甘草各五分，用姜為引，水煎服。

(122) 清熱鎮驚湯 (治急驚熱重)

清熱鎮驚膽與連，通柴甘草木荷香，

麥冬梔子神鉤共，竹葉燈心砂末研。

龍胆草一錢五分，川連、木通、鈎藤、柴胡、竹叶、甘草各一錢，木荷六分，麥冬、梔子各二錢，茯神二錢五分，和灯心一只同煎，調硃砂末服。

(123) 牛黃丸 (治急驚、神昏痰厥等)

牛黃丸劑重大黃，半夏南星枳實良，

黑白牽牛同皂角，除痰降逆有專長。

黑牽牛、白牽牛各七分，南星、枳實、半夏各五錢，牙皂二錢，大黃一兩五錢，研末，煉蜜為丸，每丸重五錢，每次酌取多少，煎湯服。

(124) 涼膈散 (治牙舌病)

(125) 加減涼膈散 (急驚退熱藥)

涼膈硝黃梔子翹，黃芩竹叶草荷饒，

竹硝減却加前枳，急性驚風熱氣消。

連翹一錢五分，大黃(酒浸)、芒硝、甘草各一錢，梔子、黃芩、木荷各七分，竹叶七片，生蜜一匙，水一杯半煎七分服，名涼膈散；去竹叶、芒硝，加前胡、枳實，名加減涼膈散。

(126) 醒脾湯 (治慢驚痰盛)

醒脾湯劑治慢驚，全蝎僵蚕參朮苓，

半夏天麻甘倉米，桔紅廣木共胆星。

全蝎、天麻各五錢，僵蚕、人參、白朮、半夏、甘草、倉米、桔紅、胆星各一錢，茯苓二錢，廣木香八分，生薑為引，水煎服。

(127) 溫中補脾湯 (治慢脾吐瀉)

補脾湯藥善溫中，參朮草苓桂附長，

半夏陈皮苳砂米，干姜白芍与丁香。

人参、白朮、半夏、陈皮、炙苳、砂仁米、白芍各一錢，炙草五分，茯苓二錢，肉桂四分，附子、干姜各八分，丁香六分，同生姜水煎服。

(128) 固真湯 (慢脾身体衰弱甚时之用)

固真湯主治慢脾，苳草朮参并桂耆，
再用淮山扶中气，症由久病此为宣。

白茯苓、炙黄耆各二錢，甘草、肉桂各五分，白朮一錢五分，人参一錢，淮山三錢，姜耆为引，水煎服。

(129) 加味理中湯 (治慢脾身体虧損)

(130) 可保立甦湯 (治慢驚通用方)

加味理中照本方，桂耆归地伏龍藏，
莢酸枸紙胡桃共，可保立甦加芍良。

加味理中湯即理中湯加熟地五錢，当归、炙耆、故紙、酸棗 (炒研)、枸杞各二錢，山莢、肉桂各一錢，胡桃核二个，姜耆为引，加伏龍肝 (即灶心土) 二兩，煎服。

加味理中湯再加白芍二錢，即可为可保立甦湯，水煎服。以上均为四歲孩童用量，更幼者，藥量应酌减。

(131) 清肝理脾湯 (疳症除虫藥)

理脾湯藥善清肝，麥柚青陈甘草同，
連用川胡稜莢朮，蒼榔蕪使总除虫。

蕪莢、三稜、莢朮、陈皮、蘆薈、胡連、甘草各一錢，青皮、麥芽、神柚、枳榔各一錢五分，使君肉三錢，川連五分，加灯心，水煎服。

(132) 肥儿丸 (治疳積)

治疳最要肥儿丸，苓草朮参蘆薈餐，

查子麥芽同神柚，川胡使肉是仙丹。

人參二錢五分，胡連、白朮各五錢，茯苓三錢，川連二錢，使君肉四錢，神柚、麥芽、查肉各三錢五分，炙草一錢五分，蘆薈二錢五分，研為末，米糊為丸，如黍米大，每服二、三十丸，米湯送下。

(133) 參苓白朮散 (治疳症)

參苓白朮善調脾，薏米淮山扁豆施，

蓮子陳皮同桔梗，縮砂加入更相宜。

人參、茯苓、白朮、薏米、扁豆、淮山藥、蓮子(去心)各五錢，陳皮三錢，縮砂、桔梗各二錢，炙草一錢，研為末，每服一錢，米湯送下。

(134) 仙方活命湯 (治瘡瘍初起)

仙方活命芷防呈，乳沒芍歸銀貝陳，

皂甲草梢同花粉，腫瘍初起此堪珍。

山甲三大片，皂刺、赤芍、乳香、沒藥各五分，歸尾、陳皮各一錢五分，草梢、花粉、貝母、白芷各一錢，防風七分，金銀花三錢，加酒水，煎服。

(135) 托里消毒散 (治瘡瘍未成膿)

托里消毒善補虛，參朮苓甘歸芍儲，

芎芷皂銀芪桔類，腫瘍未潰此以疏。

人參、川芎、黃芪、當歸、白朮、茯苓、銀花各一錢，白芷、甘草、皂尖、桔梗各五分，水煎，食遠服。身體衰弱者去白芷，加人參。

(136) 陽和湯 (治癰癤及陰疽結核等)

陽和湯善治陰疽，肉桂炮姜熟地俱，

鹿角膠煎同麻草，酒加多服总无虞。

熟地一兩，鹿角膠三錢，肉桂、甘草各一錢，炮姜、麻黃各五分，水煎服，服藥后飲酒數杯，服至病愈為度。

(137) 保元大成湯 (治瘡瘍多膿)

保元湯劑號大成，參朮苓甘歸芍珍，

附子山萸芪五味，陳皮廣木又砂仁。

人參、白朮、黃芪各二錢，茯苓、白芍、陳皮、歸身、炙草、附子、山萸肉、五味子各一錢，木香、砂仁各五錢，水煎服。

(138) 當歸湯 (治跌打損傷未破口，雖氣已絕，灌之亦活)

傷科最重當歸湯，芎朮桃紅鼓血行，

澤瀉丹皮調酒服，此方加減用維宏。

當歸、澤瀉各五錢，川芎、紅花、桃仁、丹皮各三錢，蘇木二錢，酒水同煎服。頭傷加藁木，手傷加桂枝，腰傷加杜仲，脅傷加芥子，腳傷加牛膝。

(139) 白糖飲 (治損傷)

用熱酒沖白糖一、二兩，灌服，可免瘀血攻心。

(140) 玉真散 (治跌打損傷已破口者)

玉真散是傷科珍，內服外敷用最神，

主力特推白附子，羌防白芷等南星。

天麻、羌活、防風、生南星、白芷各一兩，白附子十二兩，淨研極末，敷于傷口，并用熱酒沖服三錢（不飲酒者用開水沖服亦可）。

(141) 刀傷止血藥 (外傷止血藥)

卽黑錫丹方：沉香、肉桂、破故紙、胡蘆巴、生附子、金鈴

肉、石硫黃、黑錫、广木香、肉豆蔻、小茴香各等分，炮制研末，糯米稀粥和为丸，每粒重二錢。凡遇刀伤、槍伤及炸炮各伤，均可將此丸細嚼，敷伤口，再用布扎之。或取少許用自己的小便送服，能止血、止痛。

(142) 消癰丸 (治療癰初起)

消癰丸內用元參，川貝合將牡蠣兼，

每用三錢開水下，三餐同服莫為嫌。

元參(蒸)、牡蠣(煨)、川貝(去心蒸)各四兩，煉蜜为丸，每服三錢，一天服三次，開水送下。

(143) 防風薤芫湯 (治痔瘡通用藥)

通治痔瘡防芫湯，芎歸地芍朮苓長，

連翹梔草枳枳壳，槐角地榆芷與黃。

防風、薤芫、當歸、川芎、生地、白芍、赤茯苓、連翹各一錢，枳榔、甘草、梔子、地榆、枳壳、槐角、白芷、蒼朮各二錢，水煎，食前服。便秘加大黃二錢，下血去川芎、連翹、白芷，加苦參子一錢。

(144) 疏風清肝湯 (治眼赤痛)

疏風要用清肝湯，防芩芎歸赤芍良，

梔菊銀翹甘柴薄，眼科主治有奇長。

歸尾、赤芍、荊芥、防風、川芎、菊花、山梔、薄荷各一錢，柴胡、連翹各一錢五分，銀花二錢，甘草五分，燈心一撮，水煎，食遠服。

(145) 瀉肝湯 (治眼病)

瀉肝湯內用硝黃，正是眼科外障方，

地骨黑參柴知母，車前芫薤莫相忘。

車前、地骨、芒硝、黑參各一錢，大黃、知母各一錢五分，
柴胡、羌蔚各二錢，水煎，空腹服。

(146) 蘆薈消疳飲 (治牙疳專藥)

蘆薈消疳用石膏，銀柴梔梗胡連和，

牛蒡羚羊升竹葉，甘草元參并木荷。

蘆薈、銀花、柴胡、胡連、牛蒡、元參、桔梗、山梔、石
膏、木荷、羚羊角各五分，甘草、升麻各三分，淡竹葉十片，水
煎，食后服。

(147) 喉痛方 (治纏喉、鎖喉、乳蛾、風火閉住之症)

喉痛湯方蘇芍前，元參翹桔貝甘煎，

乳蛾纏鎖奇難症，火閉邪深用不延。

蘇子、前胡、赤芍各二錢，甘草、桔梗各一錢，元參、連
翹、浙貝各一錢五分，水煎服。

(148) 養陰清肺湯 (治喉症專藥)

養陰生地實為君，麥芍丹荷甘貝群，

重用元參清肺火，白喉正藥舊傳聞。

生地一兩，麥冬六錢，白芍、貝母、丹皮各四錢，木荷二錢
五分，元參八錢，甘草二錢，水煎服。

(149) 清咽利膈湯 (治喉病)

利膈古傳清咽方，荊防玄桔銀翹蒡，

喉科風熱宜涼藥，連木苓梔硝草黃。

牛蒡子、連翹、荊芥、防風、梔子、桔梗、玄參、黃連、銀
花、黃芩、木荷、甘草各二錢，大黃、朴硝各一錢，加淡竹葉二
錢，水煎，食遠服。

(150) 仙遺糧湯 (治楊梅瘡初期)

遺粮灵芷芎归梔，牛茯銀翹連葛宜，

藜薏荆防芩粉草，初期梅毒总堪医。

灵仙、白芷、川芎、当归、梔子、花粉各二錢，土茯苓六錢，銀花、連翹、牛膝、葛根、痰藜各一錢五分，薏米三錢，荆芥、防風、黃連、黃芩、甘草各一錢，水煎服。

(151) 土茯苓湯 (楊梅瘡通用解毒藥)

土茯苓方用鮮皮，木通薏米銀花施，

瓜防皂角均加入，梅毒蔓延此最宜。

土茯苓一兩，鮮皮、木通、防風各一錢，木瓜、薏米、銀花各二錢，皂角子四分，水煎服，每日服一剂，以愈为度。

(152) 升麻解毒湯 (治楊梅瘡結毒)

升麻解毒治梅瘡，皂刺助成土茯功，

咽桔肩羌胸腹芍，芷巔牛下法宜崇。

升麻、皂刺各四錢，土茯苓一斤，加酒水煎服。瘡生頂上加白芷，咽內加桔梗，胸腹加白芍，背肩加羌活，下部加牛膝。

(153) 鵝黃散 (治楊梅瘡外用藥)

鵝黃輕粉与石膏，黃柏同研藥性和，

瘡發楊梅痛不止，外敷方剂此为豪。

輕粉、石膏、黃柏，研末，外敷患处。

(154) 黃芪內托湯 (治下疳、橫痃、魚口、便毒等)

黃芪內托主芎归，皂角蜜銀花粉依，

白朮草梢兼澤瀉，解除梅毒力非微。

黃芪、当归、川芎各二錢，銀花、皂角、白朮、花粉各一錢，甘草、澤瀉各五分，水煎服。

(155) 人參排毒散 (治痢病初症及感冒等)

(156) 倉廩湯 (治病病)

(157) 荊防排毒散 (治感冒及風疹等)

人參排毒草芥芎，羌獨柴前枳桔同，

倉米加除噤口痢，荊防換治血家風。

人參、茯苓、枳殼、桔梗、柴胡、前胡、羌活、獨活、川芎各一錢，甘草五分，加生姜煎，名人參排毒散；加倉米，名倉廩湯；去人參，加荊芥、防風，即名荊防排毒散。

(158) 防風通聖散 (治感冒大小便不通)

防風通聖大黃硝，荊芥麻黃梔芎翹，

甘桔芎歸膏滑石，木荷芥朮力偏饒。

防風、荊芥、連翹、麻黃、木荷、川芎、當歸、白芍、白朮、山梔、大黃、芒硝各五分，黃芩、石膏、桔梗各一錢，甘草二錢，滑石三錢，加生姜，煎服。

(159) 銀翹散 (治感冒、溫病等)

銀翹散用桔木荷，竹葉牛蒡甘草和，

芥穗再加淡豆豉，方從涼膈辛涼多。

連翹、銀花各一兩，桔梗、木荷、牛蒡子各六錢，芥穗（炒）、竹葉各四錢，生甘草、淡豆豉各五錢，研為末，每取六錢，和鮮葦莖湯同煎，香氣大出後，即取服。病重者日三服，輕者日兩服。

(160) 桑菊飲 (治感冒、溫病輕症)

桑菊飲中有杏仁，連翹桔梗木荷珍，

葦莖炒過調甘草，咳嗽風溫用最頻。

杏仁二錢，連翹一錢五分，生甘草、木荷各八分，桑葉二錢五分，菊花、桔梗各一錢，葦莖（炒）三錢，水煎服。

(161) 升麻葛根湯 (治癰痧或痘疹未發透時用)

錢氏升麻葛根湯，芍藥甘草合成方，

陽明發熱兼頭痛，下利生癰疹痘匡。

升麻三錢，葛根、芍藥各二錢，炙草一錢，水煎服。

(162) 治疫清涼散 (治癰痧熱重)

治疫清涼芩芍知，貝翹荷葉與丹皮，

中黃再合柴胡黃，解穢除邪用不疑。

柴胡、藜蘂、赤芍、知母、川貝、連翹各一錢，荷葉七分，

丹皮五錢，人中黃二錢，水煎服。便閉加大黃，病久體虛加

人參、白朮、當歸等。

(163) 化癰湯 (治癰痧)

化癰知母并石膏，甘草元參犀角熬，

粳米加來存胃液，消除內熱利吾曹。

石膏一兩，知母四錢，生甘草、元參各三錢，犀角二錢，粳米一合，水煎服。

(164) 藿香正氣湯 (治霍亂輕劑)

藿香正氣芷陳蘇，甘桔茯苓朮朴俱，

夏朮腹皮加姜棗，感傷嵐障并能驅。

藿香、白芷、腹皮、紫蘇、茯苓各三兩，陳皮、白朮、厚朴、半夏朮、桔梗各二兩，甘草一兩，研細末，每取五錢和姜棗煎服。

(165) 枳實導滯丸 (治霍亂)

導滯方推枳實黃，芩連朮朮茯苓勤，

餅蒸澤瀉糊丸服，濕熱蠲除力最強。

大黃一兩，枳實(麩炒)、黃芩(酒炒)、黃連(姜汁炒)、

神柚(炒)各五錢,白朮(土炒)、茯苓、澤瀉各二錢,蒸餅糊丸,按虛實症酌量服,開水送下。

(166) 芍藥湯 (治痢病初起)

初痢多宗芍藥湯,苓連檳草桂歸香,

青黃枳朴均加入,後重便膿得此良。

白芍、當歸各一錢五分,黃連、黃芩各一錢二分,肉桂四分,檳榔一錢,木香六分,甘草四錢,大黃一錢(虛者不用),厚朴(炙)一錢,青皮五錢,枳殼一錢,清水煎服。

(167) 白頭翁湯 (治熱痢)

白頭翁主厥陰利,身熱後重不可棄,

苓柏秦皮四味煎,堅下兼平中熱熾。

白頭翁一錢,黃柏、黃芩、秦皮各一錢五分,水煎服。

(168) 真人養臟湯 (治久痢)

真人養臟木香訶,粟殼當歸肉蔻科,

朮芍桂參甘草共,脫肛久痢即安和。

訶子(柚裏煨)一兩一錢,罌粟殼(去蒂,蜜炙)三兩二錢,肉豆蔻(柚裏煨)五錢,當歸、白朮(炒)、白芍(酒炒)、人參各六錢,木香一兩四錢,肉桂(去粗皮)八錢,生甘草一兩五錢,剉為粗末,每取四錢,水煎,食前溫服。

(169) 截瘧七寶飲 (治瘧疾)

常山截瘧同草果,檳榔甘草青陳伏,

水酒合煎露宿溫,陽經實症此為寶。

常山(酒炒)、草果(煨)、檳榔、厚朴、青皮、陳皮、甘草各等分,水酒各半煎,露一宿,于發病日早晨溫服。

(170) 活血解毒湯 (治鼠疫專藥)

彙編活血解毒湯，翹地桃紅歸朴膏，

生草葛根兼柴芍，時邪鼠疫此為良。

連翹三錢，生地五錢，桃仁八錢，紅花五錢，當歸一錢五分，厚朴一錢，赤芍、甘草、葛根、柴胡各二錢，水煎服。孕婦加黃芩、桑寄生，去桃仁、紅花，改用紫草、紫背天葵等；產後血流過多，去桃仁、紅花、柴胡、葛根，加芥穗、丹參；產後血枯生風，去柴胡、紅花、桃仁、葛根，加丹參、荊芥、天麻、稽豆。

（171）清燥救肺湯（治鼠疫唾血）

救肺湯中參草麻，石膏膠杏麥枇杷，

經霜收下干桑葉，解郁滋肝效可誇。

經霜桑葉三錢，石膏（煨）二錢五分，甘草、黑芝麻各一錢，人參、杏仁（去皮尖）各七分，阿膠八分，枇杷葉（去皮，蜜炙）一片，麥冬一錢二分，水煎溫服。痰多加貝母，血枯加生地，熱甚加犀角或羚羊角。

（172）腦膜炎初期方（治腦炎初起頭痛、發熱、作嘔）

小兒初病腦膜炎，石決鉤藤桑葉添，

野菊翹荷梔子黑，郁金淡竹用無嫌。

石決明一兩，桑葉、黑梔各二錢，鉤藤四錢，木荷八錢，郁金、野菊各一錢五分，連翹、淡竹葉（卷心）各三錢，水煎服。

（173）治腦膜炎方（治腦膜炎）

腦膜發炎用硝黃，胆草芩連枳朴行，

再用鉤藤及干葛，瘈瘲痙攣力能匡。

生軍、鉤藤、龍胆草、芒硝、黃芩各三錢，川連、朴根各一錢，枳實二錢，葛根五錢。初起嘔吐甚，去芒硝，加半夏四錢；

口渴者加天花粉一兩、山梔三錢；夾痧疹加生石膏一兩，知母五錢，板藍根三錢，丹皮二錢，生地二兩；小便淋痛，加木通一錢；若太陽已通而頭痛身疹者，去芒硝，加羌活、天麻各一錢五分，水煎服。

(174) 清瘟敗毒飲 (治腦炎及其他重症熱病)

清瘟敗毒主石膏，生地川連犀角多，

梔子元芩知母竹，丹翹赤芍桔甘和。

生石膏八錢至八兩，生地二錢至一兩，犀角二錢至六錢，川連一錢至四錢，梔子、桔梗、黃芩、知母、赤芍、元參、連翹、甘草、丹皮、竹叶等，視病情酌用多少，水煎服。

(175) 六神丸 (治時邪癘毒、癰喉、丹痧、喉風、雙單乳蛾、疔毒、對

口、癰疽發背、乳岩和一切無名腫毒等)

六神丸劑遠傳揚，珠粉腰黃元寸香，

冰片蟾酥施化用，藥衣百草可為霜。

西黃一錢五分，腰黃、正珠粉、元寸香、冰片各一錢，合研末并用蟾酥施化為丸，如芥菜子大，以百草霜為衣。每服十粒，小兒減半，開水送下。

(176) 安宮牛黃丸 (腦膜炎及其他熱病神志昏迷用之)

牛黃丸劑號安宮，犀麝珠砂梅片充，

梔子鬱芩連金箔，神昏癰瘡效無窮。

牛黃、郁金、犀角、黃連、山梔、黃芩、硃砂各一兩，梅片、麝香各二錢五分，真珠五錢，煉蜜為丸，每丸重一錢，金箔為衣，蠟為壳，每服一丸。

(177) 歸宗湯 (治痘疹通用方)

歸宗湯治痘始終，地芍青黃芥與通，

益以牛蒡兼查肉，此方加減有殊功。

大黃（生用）六錢，荊芥五分，生地（酒洗）八錢，赤芍、青皮各一錢五分，牛蒡（炒研）一錢，木通八錢，山查五分，煎服。病在四日以內，如大渴、譫妄、失血、頭汗、身汗、身熱肢涼、舌刺、唇焦、口穢、有一切發揚之火，宜加石膏（煨）八錢；四日以後，身熱一退，即宜去之；待七日後，血活身熱，方可再加。此外，本方若加紫草（非紫梗，酒洗）二錢五分，必待血透勻而後去之。

（178）保元湯（痘疹發不透用之）

補養諸方首保元，參芪桂草四般存，

大人虛損几科痘，補氣回陽力最尊。

黃芪四錢，人參二錢，甘草一錢，肉桂三分（春夏用量）或六、七分（秋冬用量），水煎服。

（179）忍冬湯（治痘發余毒）

忍冬湯用芍銀花，羌芥翹芩通草加，

再益紅花勞貝母，痘疹余毒總可瘥。

金銀花、黃芩各一錢，赤芍五錢，牛蒡、土貝母、木通各八分，連翹一分，荊芥穗、羌活各五分，甘草二分，紅花二錢，水煎服。毒留在下部加牛膝，痘疔加歸尾、青皮、地丁，癰加生地、皂刺、地丁，牙疳加天花粉二錢。痘後一切余毒，輕者用忍冬湯加減；如身熱有惡症，仍用歸宗湯加減。

（180）撥雲散（治痘疹後之眼病）

撥雲散用芥連通，黃菊金銀羌芍同，

羚羊燈心調甘草，谷精退翳有奇功。

木通五錢，荊芥穗五分，大黃、甘菊、甘草各三分，谷精五

分，羌活七分，川連五分，金銀花一錢，赤芍五分，灯心一分，羚羊角（磨汁）三分，水煎服。目白或紅，加生地二錢、黃芩一錢；赤腫而身熱加龍胆草一錢、石膏三錢；云翳加木賊草七分、蟬退五个。

（181）清金一貫飲（治麻疹通用藥）

清金一貫疹科宗，苓桔前青通芍从，

更益牛蒡与荆芥，合調甘草水三鍾。

黃芩一錢五分，牛蒡子、前胡各一錢，桔梗七分，荆芥穗五分，木通六分，青皮七分，赤芍五分，甘草二分，水煎服。三日出齊的加元參二錢。粗大的加大黃一錢、蟬退五个。稠密不勻加大黃、山查各三錢。深紅加生地、丹皮、元參。艷紅加生地、大黃、丹皮、石膏、元參。干紅加大黃、紫草、生地、丹皮、桃仁。色紫加大黃、紫草、生地、丹皮、石膏。色艷加大黃、紫草、生地、石膏。色黯加大黃、紫草、桃仁、生地。色白加大黃、紫草、桃仁、歸尾。大渴加石膏、大黃。舌刺加石膏、大黃、生地、黃連。大熱加石膏、大黃、生地。肢冷加大黃、丹皮、石膏。譫語加大黃、黃連、石膏、犀角、生地。干嘔加大黃、黃連、甘草、滑石。痰迷加黃連、犀角、川貝母。腹滿加大黃、枳殼。咳嗽加貝母。發喘加大黃、桑皮、石膏、枳殼。口噤加石膏、大黃。咬牙加生地、大黃、石膏。喉腫及痛加大黃、金銀花、石膏、山查根。頭腫同上。鼻衄加大黃、山梔、生地、犀角。小便短赤，加黃連、豬苓、滑石。泄瀉加澤瀉、黃芩。大便秘不通加大黃、枳實、滑石。腹痛加大黃、赤芍、青皮。瀉痢加大黃、黃芩、滑石。

（182）桂枝湯（傷寒太陽病有汗症用）

桂枝湯治太陽風，芍藥生姜棗草同，

頭痛項強兼有汗，加來稀粥可成功。

桂枝、白芍各三錢，炙草二錢，生姜三片，紅棗四枚，水煎溫服，須臾啜稀粥，并溫復使微出汗，則愈。

(183) 桂枝麻黃各半湯 (治傷寒太陽病有汗熱不解)

取桂枝湯和麻黃湯各半，合而服之。

(184) 桂枝二麻黃一湯 (治傷寒太陽病大汗後熱不解)

取桂枝湯二份、麻黃湯一份，合而服之。

(185) 麻黃湯 (治傷寒太陽病无汗)

麻黃湯內用桂枝，甘草杏仁四味施，

發熱惡寒頭項痛，傷寒服此汗淋漓。

麻黃三錢，桂枝二錢，炙草一錢，杏仁二十三枚，先煎麻黃并去沫，和諸藥同煎，溫服。服藥後，復蓋使微出汗，不須啜粥。

(186) 大青龍湯 (治太陽病无汗煩躁用)

大青龍內桂麻黃，甘杏石膏姜棗藏，

發熱身疼兼煩躁，太陽脈緊服安康。

麻黃六錢，桂枝、炙草各二錢，杏仁十二枚，生姜三錢，大棗四枚，石膏四錢五分。先煎麻黃去沫，後和諸藥煎，溫服，取微似汗。汗多者，以溫粉（白朮、藁本、川芎、白芷和米為末）扑之。

(187) 桃仁承氣湯 (治太陽病膀胱蓄血症)

桃仁承氣五般奇，甘草硝黃并桂枝，

熱結膀胱小腹脹，發狂蓄血最相宜。

桃仁（去皮尖）十六粒，大黃四錢，甘草、桂枝各二錢，芒

硝三錢，清水煎服。

(188) 葛根湯 (治陽明病項背強直)

(189) 桂枝加葛根湯 (治陽明病項背強直且痛兼自汗)

葛根湯本桂枝湯，麻葛增來用不妨，

單入葛根名加葛，邪侵項背总能匡。

葛根四錢，麻黃三錢，桂枝、甘草(炙)、生姜、白芍各二錢，大棗四枚，水煎服，為葛根湯。桂枝湯加葛根四錢，名為桂枝加葛根湯，水煎服。

(190) 麻仁丸 (輕瀉藥)

素常脾約感風寒，須用麻仁潤下丸，

杏芍大黃兼枳朴，脾陰得潤胃腸寬。

火麻仁(另研末)、杏仁、芍藥、枳實(炒)、厚朴各五兩半，大黃(蒸焙)十兩，共研末，煉蜜為丸，如桐子大，初服十丸，後漸加，至有便意為度。米湯送下。

(191) 蜜煎導方 (瀉下藥)

將蜜一杯置于銅器內煮如飴狀，趁熱并手捻作挺狀，頭銳，粗如指，長二寸。用時蘸些皂角末，納入谷道中，以手按住，至欲大便時乃去之。

(192) 豬胆汁導方 (瀉下灌腸藥)

豬胆一個和醋少許，用竹管灌入谷道中，一食之頃，大便即出。

(193) 梔子豉湯 (催吐藥，溫病欲嘔不得用之)

梔子五至七枚，香豉四錢。先煎梔子，後入香豉煮服，吐後止服。

(194) 大柴胡湯 (治急性胃腸病發熱)

大柴胡湯用大黃，枳實夏苓芍藥藏，

加入棗姜表裏里，內攻亦可并外防。

大黃一錢，柴胡四錢，半夏二錢，黃芩、芍藥、枳實各一錢五分，大棗二枚，生姜二錢五分，水煎服。

(195) 大陷胸湯 (治傷寒喘息及結胸症)

(196) 小陷胸湯 (治咳嗽及結胸輕症)

硝黃甘遂大陷胸，破硬此方力最強，

連夏瓜蘊除滿痛，陷胸小劑效無窮。

大陷胸湯：大黃二錢，芒硝一錢，甘遂末三分，先煮大黃并去滓，后入芒硝煮沸，納甘遂末服。

小陷胸湯：黃連一錢，半夏二錢，瓜蘊三錢，水煎服。

(197) 桂枝加芍藥湯 (治腹滿時痛)

即桂枝湯加芍藥一倍。

(198) 桂枝加大黃湯 (治腹痛便硬)

即桂枝加芍藥湯再加大黃七分。

(199) 梔子柏皮湯 (治黃疸發熱)

梔子六、七枚，柏皮二錢，甘草一錢，水煎服。

(200) 麻黃附子細辛湯 (治少陰病發熱)

麻黃二錢，細辛二錢，附子一錢。先水煎麻黃并去沫，后入諸藥同煎服。

(201) 麻黃附子甘草湯 (治少陰病輕微發熱)

即上方去細辛，加炙甘草二錢。

(202) 四逆湯 (治少陰下利清谷症)

(203) 通脈四逆湯 (治少陰腹痛、干嘔、脈不出或大而脈)

(204) 茯苓四逆湯 (治傷寒怔忡、尿短)

四逆姜附君甘草，茯苓方立加参好，

干姜倍用通脉称，汗出而厥为至宝。

炙草四錢，干姜、生附子各二錢，为四逆湯；再加干姜二錢，为通脉四逆湯；加入参一錢、茯苓六錢，即为茯苓四逆湯。水煎服。

(205) 真武湯 (治少陰病下利、肢痛)

真武湯壯腎中陽，茯苓朮芍附生姜，

少陰腹痛有水气，喘逆悸眩病最良。

茯苓、芍藥、生姜各三錢，白朮、附子(炮)各二錢，水煎服。

(206) 附子湯 (治少陰病手足冷、全身骨節痛)

口和脉細背憎寒，附子湯煎卽刻安，

芍藥人參苓朮附，身疼肢冷是仙丹。

附子、人參各二錢，茯苓、芍藥各三錢，白朮四錢，水煎服。

(207) 白通湯 (治少陰病下利)

白通湯內用干姜，附子須調葱白營，

辛苦惟能通上下，少陰下利有奇長。

干姜三錢，附子(生用)三錢，葱白二根，水煎服。

(208) 白通加猪胆汁湯 (治少陰病利不止、干嘔、无脉)

白通湯加猪胆汁一湯匙、人尿半湯匙。

(209) 甘草湯 (治少陰病咽痛)

甘草六錢，水煎服。

(210) 桔梗湯 (治少陰病咽痛較劇)

甘草六錢，桔梗三錢，水煎服。

(211) 苦酒湯 (治少陰病咽痛、生瘡等)

半夏(洗)七枚(切作十四片)，雞蛋一个，取蛋白和半夏著苦酒中，煮兩沸后去滓，少少含咽之，至愈为度。

(212) 半夏散及湯 (治少陰病咽痛)

咽痛少陰病挾痰，風邪相迫勢难堪，

桂枝半夏及甘草，經訓当遵勿妄談。

半夏、桂枝、炙草各等分，研为末，开水和服。每服二錢，一日服三次。

(213) 猪膚湯 (治少陰病咽痛、胸滿、心煩)

猪膚四兩，水六杯煎至三杯，去滓，加白蜜半盞、米粉三錢，熬至香味出，分三次服。

(214) 黃連阿膠湯 (治少陰病心煩不得臥)

心煩不臥主阿膠，雞子芩連芍藥交，

邪入少陰从热化，救陰扶正渠能拋。

黃連四錢，黃芩一錢，芍藥三錢，水煎，去渣，入阿膠三錢，待烱尽稍冷后，和蛋黃一枚攪勻，溫服，一日三服。

(215) 桃花湯 (治少陰病腹痛、下利、便膿血)

少陰下血便膿血，粳米干姜赤脂啜，

陽明截住腎亦安，腹痛尿短不可缺。

赤石脂八錢(留一錢研末)，干姜五分，粳米四錢，水三杯煎一杯，入石脂末一錢，調服，一日三服。

(216) 烏梅丸 (治厥陰病心中煩熱、飢不欲食、吐衄)

烏梅丸內柏連姜，參桂椒辛歸附營，

寒熱散收相互用，厥陰得此保康強。

烏梅九十三枚，干姜一兩，當歸四錢，黃連一兩六錢，蜀椒

四錢，桂枝、人參、黃柏、附子、細辛各六錢，各研末（除烏梅外），以苦酒浸烏梅（去核），蒸之并搗成泥，和藥攪勻，煉蜜，共搗為丸，如桐子大。每服十九至二十九，日服三次。

（217）**当归四逆湯**（治厥陰病手足厥冷、脉微）

古有当归四逆湯，辛通桂芍合成方，

加來棗草為藥引，肢厥脉微得此康。

当归、桂枝、白芍、炙草、木通、細辛各二錢，紅棗（擘）五枚，水煎服。

（218）**炙甘草湯**（治厥陰病脉停、心下悸）

炙甘草湯用麻仁，桂姜生地麥冬珍，

阿膠大棗加參酒，肺痿虛勞效若神。

桂枝、生姜各一錢五分，人參一錢，炙草、火麻仁、麥門冬、阿膠各二錢，生地八錢，大棗四枚，水酒各半煎服。

（219）**小建中湯**（治厥陰病腹急痛）

小建中湯理煩悸，尺迟营虛尤須記，

桂枝倍芍加飴糖，厥陰積水症以治。

生白芍三錢，桂枝、生姜各一錢五分，炙草一錢，大棗四枚，水煎去滓，加入飴糖四錢，待烊，溫服。

（220）**茯苓甘草湯**（治厥陰病厥而心悸）

甘草茯苓姜桂枝，悸而汗出兩般施，

五苓散症口必渴，辨別分明用不疑。

茯苓、桂枝各二錢，炙草一錢，生姜三錢，水煎服。

（221）**四逆散**（治少陰病肢厥、泄瀉）

柴胡、枳實、白芍、炙草各等分，水煎服。

（222）**桂枝加附子湯**（治傷寒發汗、漏不止、小便難）

桂枝方藥變萬般，汗下過多治最難，

去芍特加川附子，惡風肢急保康安。

桂枝、生姜、附子各三錢，炙草一錢五分，大棗三枚，水煎溫服。

(223) 五汁飲 (治溫病口沫粘滯)

五汁飲中麥藕梨，葦根與荸配相宜，

如將藕汁易蔗漿，也可亡津燥熱治。

梨汁、荸薺汁、鮮葦根汁、麥冬汁、藕汁，隨症酌量服用。如無藕汁，用蔗漿亦可。

(224) 清營湯 (治溫病舌焦不渴)

清營湯內用犀砂，生地元參竹葉加，

連麥銀翹柔潤品，脈虛不寐效堪誇。

生地五錢，犀角、銀花、麥冬、元參各三錢，竹葉心一錢，川連二錢五分，丹砂、連翹（連心用）各二錢，水煎服。

(225) 清宮湯 (治溫病神昏譫語)

清宮湯內主元參，犀角連翹竹葉欽，

再益麥冬通脈絡，苦寒不竟在蓮心。

元參心三錢，蓮子心五分，竹葉卷、連翹心、犀角尖（磨沖）各二錢，麥冬（連心）三錢，水煎服。熱痰多加竹瀝、梨汁各五匙，咯痰不出加瓜蒌皮，發熱毒甚加入中黃。

(226) 紫雪丹 (治溫病神昏譫語退熱重劑)

紫雪丹需羚羊犀，四香五石朴硝施，

元升炙草辰砂入，開竅祛邪用不疑。

磁石、朴硝、硝石各二斤，滑石、石膏、寒水石、升麻、元參各一斤，羚羊角、犀角、木香、沉香各五兩，丁香一兩，麝香

一兩二錢，炙甘草八兩，辰砂三兩，制丹，冰水調服，每次服一、二錢。

(227) 減味竹葉石膏湯 (治溫病中焦症熱盛、脈浮促)

減味石膏竹葉方，麥冬甘草合煎湯，

中焦溫熱脈浮促，粳夏蠲除用更良。

竹葉五錢，麥冬六錢，石膏八錢，人參三錢，甘草二錢，為減味竹葉石膏湯 (即原方減去粳米、半夏)，水煎服。

(228) 護胃承氣湯 (治中焦症下后熱不退、口渴、咽干、舌黑或金黃色、脈有力)

護胃消積承氣湯，中焦熱渴用無妨，

麥冬元地皆補藥，只有知黃性頗涼。

生大黃、元參、細生地、麥冬各三錢，丹皮、知母各二錢，水煎服。

(229) 增液湯 (治無上焦症，不大便，體虛)

增液元參用最多，麥冬生地却同科，

體虛大便如難下，退熱寬腸法最高。

元參一兩，麥冬 (連心)、生地各八錢，水煎服。

(230) 加減復脈湯 (治溫病熱甚、脈停止)

(231) 三甲復脈湯 (治溫病熱深厥深、脈細、心悸悸)

復脈方由加減成，膠麻麥芍地甘仍，

特增蠣鱉龜板，三甲鎮心法可憑。

加減復脈湯：炙甘草、生地黃、生白芍各六錢，麥冬五錢，火麻仁、阿膠各三錢，水煎服。

三甲復脈湯：炙甘草、生地黃、生白芍各六錢，火麻仁、阿膠各三錢，麥冬、生牡蠣、生鱉甲、生龜板各一兩，水煎服。

(232) 清暑益气汤 (治温病发热、身痛、肢冷、自汗)

清暑益气草参芪，麦味青陈袖柏奇，

二朮葛根升泽瀉，暑伤元气此为宜。

炙黄芪一钱五分，当归七分，人参、麦冬、青皮、陈皮、黄柏、苍朮、白朮各五分，葛根、泽瀉各二钱，神袖八分，五味子、升麻、炙甘草各三分，加生姜、红棗煎服。

(233) 生脉散 (治热伤脉絕、气短、口渴、有汗)

生脉立方法最奇，麦冬五味与参施，

病危暑月堪救急，脉絕他时亦用之。

人参二钱，麦冬三钱，五味子一钱，水煎服。

(234) 加味清宫汤 (治热久、舌絳苔少)

清宫加味重原方，專治热邪势猖狂，

知母銀花兼竹瀝，增来藥性总寒凉。

即清宫湯加知母、銀花、竹瀝，水煎服。

(235) 三才汤 (治暑温热久、神識不清)

湯号三才天地人，安神退热此为珍，

暑温病入下焦后，主要治療在益津。

人参三钱，天冬二钱，干地黄五钱，水煎服。

(236) 三仁汤 (治湿温神昏、耳聾、目瞑、泄瀉)

三仁杏蔻薏共同，滑竹白通夏朴管，

目瞑耳聾不欲語，神昏体重用无妨。

杏仁、半夏各五钱，竹叶、厚朴、通草、白蔻仁各二钱，滑石、薏苡仁各六钱，水煎，日分三次服。

(237) 一加减正气散 (治湿温皖满腹胀、大便不暢)

正气方名溯藿香，一加消脹有專長，

杏茵柚麥三皮朴，湿郁中焦此最良。

藿香、茵陈、杏仁、茯苓皮各二錢，大腹皮、陈皮各一錢，厚朴三錢，神柚、麥芽各一錢五分，水煎服。

(238) 杏仁薏苡湯 (治湿温咳嗽、头脹、肢体若廢)

杏仁薏米苦辛温，朴夏藜防姜桂香，

舌白不飢头脹咳，身肢若廢此为尊。

杏仁、薏苡各三錢，白蒺藜二錢，半夏、防己各一錢五分，厚朴一錢，桂枝五分，生姜七分，水煎服。

(239) 宣清導濁湯 (治湿温神昏蒙阻、大便不下)

宣清導濁茯苓餐，皂莢蚕砂效足觀，

邪湿久羈少腹硬，便难竅阻神昏安。

猪苓、茯苓各五錢，寒水石六錢，晚蚕砂四錢，皂莢子(去皮)三錢，水煎服，至大便通暢为度。

(240) 三黃石膏湯 (治伤寒或温病热甚、脉洪大、神昏)

芩連梔柏与石膏，益以豉麻表散多，

大热神昏脉洪数，法同双解較平和。

石膏四錢，麻黄一錢五分，黄芩、黄連、豆豉、黄梔子、黄柏各二錢，水煎，冷服。

(241) 金鎖固精丸 (治遺精)

固精金鎖芡蓮須，龍骨蒺藜牡蠣須，

蓮子糊丸米飲下，滑遺无夢虛煩除。

沙苑、蒺藜、芡实、蓮須各二兩，龍骨、牡蠣各一兩，共研細末，和蓮子肉(煮糊)为丸，用鹽湯送下，每次服三、五錢。

(242) 牛黃鎮驚丸 (治驚風重症)

鎮驚重症用牛黃，天竺雄砂珠珀行，

全蝎僵蚕星蒲桔，神防麻貝木麝香。

牛黄、琥珀、木香各二錢，僵蚕、防風、雄黄、川貝母、天麻、桔紅各三錢，天竺黄三錢五分，茯神五錢，胆星一兩，麝香二分，各取淨末，用胆星烱化为丸（每丸重四分），先取半丸炖服，以后再續服半丸。

附錄：八法藥性賦

中医藥物治療，分汗、下、溫、清、補、消、和、吐等八法。在实际治病中，多注意前六法（和法与清法略同，吐法很少采用）。六法和“表里寒热虚实”等六綱（注一）、“浮沉迟速細大”等六脉（注二）是中医治療的基本原則。惟藥物种类繁多，不易記憶，故按八法的順序，撰为韵語，便于初学者誦讀。

（一）汗下法（注三）用藥：

發汗之藥，適于脉浮。麻葛之性最烈（麻黄強發汗又止喘，葛根發汗、止渴、治項強），羌獨之功亦超（羌活發汗、止全身痛，獨活發汗、除風湿痹痛）。荆防宜于头部（荆芥發汗、止痛、利咽、清头目，防風發汗、止痛、并不燥热），苏荷利于

注一：原为八綱，其中“陰陽”兩綱包括“表里寒热虚实”在內，可称总綱。

注二：原为八脉，其中“長短”兩脉，是素稟（无病时）強弱之脉象，因此实际治病也只注意六脉。

注三：汗法即發散病邪的療法，凡脉浮者多用之；下法即通利大便的療法，凡脉沉者多用之。

上焦（紫苏表散下气，木荷表散、利咽、消食）。胡有柴銀前三
种（柴胡和銀柴胡同治寒热往來，而柴胡以虛症为合，前胡輕表
降痰），香分藿薷豉各条（藿香开胃、止嘔，香薷發汗、利水，
暑症更適合，香豆豉發汗理气）。辛升透發著效（細辛下气搜風，
升麻透發、止喉齒痛），桂芷解表堪投（桂枝无汗能發、有汗能
止、治头項强痛，白芷治头風、眼齒痛）。頂痛須求藁本（藁本
主头痛），骨蒸应备秦艽（秦艽祛風、活血、舒筋潤腸）。夷賊
蠶搜風不廢（辛夷主鼻塞、头齒痛，木賊發汗、利水、治目
痛，蠶主風痰閉竅及膚痒），生姜葱白散气須調（生姜开胃、
止吐，葱白發汗、除痰、利水）。

若夫瀉下各品，首推大黃芒硝（大黃清腸瀉火，芒硝瀉火通
腸）。大戟甘遂芫花攻破之力猛（大戟利水消腫，甘遂治癰痢、
逐痰飲，芫花瀉水飲），麻仁牽牛蘆薈消削之力强（麻仁輕瀉，
牽牛通腸、利水，蘆薈瀉下通經）。惟是皂巴性劇（皂角开竅除
痰，巴豆峻瀉有毒），取者总屬寥寥。

（二）溫法（注）用藥：

溫法適于寒症，首推桂附二姜（肉桂溫中扶陽，附子溫中扶
陽强心；良姜止痛、止嘔、消食，干姜溫中，祛痰去寒）。調中
必資兩蔻（肉蔻消食、止久瀉，白蔻消食止呃），暖胃不廢三香
（茴香行气主疝痛，沉香开胃、破積、鎮痛、止喘，丁香主嘔
呃）。疼痛有荔枝栗壳（荔枝主疝痛，栗壳止瀉、固精、治腹
痛），瀉痢称石脂余粮（赤石脂主瀉痢、崩漏，禹余粮止血、固

注：溫法于寒症脉迟时用之。

泄、驅虫)。柿蒂收呃逆之效，灵仙祛風湿之長。砂仁吳萸川椒
 堪消脹滿（砂仁開胃、止痛、行氣、安胎，吳萸溫中止痛、治吞
 酸、嘔吐，川椒驅邪散寒、消宿食、殺虻），訶子伏龍山藥能固
 胃腸（訶子固腸，伏龍肝止嘔、止瀉，淮山藥健胃、止瀉、固帶
 瀉精）。鎮吐之品取復花赭石（旋復花除老痰，代赭石止吐），止
 血之物賴艾草霜（艾叶止血、安胎，百草霜治噎膈、止血）。
 若夫肺部受冷氣逆上冲，主以南星白附胡桃款冬（養南星祛寒
 痰、止嗽，白附子祛風痰、治血痹，胡桃固精、斂肺、潤腸，款
 冬化痰止咳）。大凡辨症論治，溫運亦可舒胸。

（三）清法（注）用藥：

清解療法，熱病為宜。病勢進行，有銀翹知石之用（銀花發
 汗解毒，連翹微發汗、排膿、殺菌，知母清熱瀉火，石膏清涼解
 熱），惡毒深重，賴青薇苦紫之施（大青治癰疹、毒痢、喉風
 等，白薇瀉血熱，苦參治菌痢，紫草根治痘疹惡瘡）。花粉枯苓
 發炎可止（天花粉止渴除煩，黃芩清涼、退熱、除痰嗽），鮮荷
 側柏出血不瀉（鮮荷葉解熱止血，側柏葉清涼止血）。欲求虛熱
 平復，要取斛藹龜甲骨皮（石斛養胃補陰退虛熱，青藹退骨蒸
 熱，龜甲退骨蒸熱、止痛，地骨皮清肺、治傳尸癆熱）。最患是
 心包邪入，譫妄垂危。牛麝羚羊適應（牛黃除痰迷熱病，麝香
 開竅通經催生，羚羊治熱狂及目疾，犀角解邪熱及癰毒、止
 血），硃砂龍牡稱奇（硃砂安神定志，龍骨安神定驚、止血、止
 汗、止夢遺，牡蠣主盜汗、夢精、并制酸）。鈎蝎去抽搐之疾

注：清法于熱病脈速時用之。

(双钩藤解热祛风，全蝎搜风、治半途歪邪)，瀝黄开痰竅之迷
(竹瀝为中風去痰藥，天竹黃安神定癇)。若夫煩躁不眠，由柏
連而安枕(黃柏退热、治黃疸、痢疾、痔疾，黃連止痢、退热、
止眼目痛)。痛眩难过，資蟬蔓以轉机(蟬退解热、治驚癇、眼
疾，蔓荊子治头痛目昏)。桑菊勞溫邪必备(桑叶清涼解热，白
菊花解热祛風、治眼疾，牛蒡子主瘡疹、喉痛)，胆玄决內热能
医(龍胆草解热、利水，玄參退热、清腸、消咽喉炎，石决明治
眼疾并增胃酸、腦炎亦用)。至于宣清肺部，枇杷无嫌(枇杷叶
止咳、消痰，杏仁止喘、平喘、潤腸)。射貝沙茹降逆(射干
祛痰、止喉痛，川貝母止喘、潤肺，浙貝母用同，沙參清肺、祛
痰，竹茹止嘔吐)，桔常部苑除痰(桔梗消炎、祛痰，常山除痰
截瘧，百部殺菌、治久嗽、傳尸癆，紫苑治吐痰、咳膿血)。
止喘推葦莖葶藶(葦莖退热、止喘，葶藶子止喘、利水)，潤燥
采百合麥冬(百合清肺、除痰，麥冬清肺、止渴、生津)。此外
利水各藥，木通防己效同(木通利水、治淋濁，木防己利小便、
治水腫及風湿痛)。加腹茵梔腫疸可退(五加皮舒筋、益精、明
目，大腹皮下气、利水、消腫，茵陈蒿解热、治黃疸有特效，黃
梔治眼疾、利水、止吐衄)。茅竹瞿薜淋濁以通(白茅根止血、
利水，淡竹叶清心、解热、通淋，瞿麥利水、通經，草薜瀉湿
热、治淋濁)。車前澤瀉猪苓滲湿最为得力(車前子利水、明
目、止咳，澤瀉利水、治水腫，猪苓利水、消水腫)，桑白灯芯
滑石疏利亦有專工(桑白皮止喘咳、消水腫，灯心草利水、清
热、安神，滑石利水、清暑气)。

(四) 补法(注)用藥:

补养各藥，黃芪称雄（黃芪补虛、歛汗、托毒）。地芍芎归关于血分（生地凉血、解热、解毒，熟地补精益骨髓，白芍理血、止痛、凉血，川芎主头痛、去瘀、調經，当归补血、滑腸、通經），酸麻柏远主乎中宮（酸棗仁安眠、歛汗、潤腸，天麻退热、鎮驚、止咳、安腦，柏子仁定悸，远志定驚、祛痰、利水）。磁石有安神之效（磁石治癇病、目內障、又平喘），五味完收歛之功（五味子止咳、平喘、治盜汗、遺精、又治神經衰弱）。枸杞谷精女貞均能明目（枸杞补肾益精、明目，谷精珠散風、明目，女貞子补肾强腰脊、明眼目），故紙杜仲虎骨尽可祛風（故紙兴陽瀉精止腰痛，杜仲强筋益精，虎骨强筋骨、治風伤痛）。狗腎菴蓉巴戟天陽萎有效（海狗腎固精壯陽，肉菴蓉益精、强筋、通便、下乳，巴戟天益精、祛風），賊骨蘆巴金櫻子精遺最佳（烏賊骨止血、退翳、治淋濁，葫蘆巴壯陽，金櫻子固腸瀉精）。首烏龜板山萸补腎之力偉（何首烏强筋、壯骨、益精，龜板治盜汗、遺精及腰痛，山萸萸止汗、补血、强精、縮小便），阿膠兔絲續斷安胎之性同（阿膠止血、除咳、舒筋、安胎，兔絲子生津、明目、壯陽、瀉精，續斷續骨起痿、安胎、消瘀）。若夫脾胃虛弱，总要参朮滋补（吉林参补虛、益陽、瀉精、定悸，紅参約同吉林参，党参补胃、生津、止久瀉，白朮健脾、利水，蒼朮健脾、利水、散寒、去湿）。玉竹芡实內金著建运之效（玉竹潤燥、补气血、祛風湿，芡实补脾、瀉精、止帶濁，鷄內金健胃、

注：补法即滋补的方法，凡体衰、脈細者多用之。

消食)，茯苓郁李益智成滲利之功（白茯苓止咳、止吐、止瀉、利水、定驚，郁李仁利水、消腫、通腸，益智仁縮小便、止瀉利）。

（五）消法（注）用藥：

消導之藥，破積為先。兩枳朴枳片切，二芽查糲水煎（枳實消食、祛痰、通腸，枳壳下氣、寬胸，川朴消痰、平胃、止吐，枳櫛消食、截瘧、除條蟲、姜片蟲，麥芽破積、開胃，谷芽化積、消食，山查化痰、除肉積，神糲健脾、消食、止瀉，孕婦忌用）。皮類則青陳相似（青皮平肝、發汗、消食，陳皮解表、化痰、行滯），香中有木附同般（木香發汗、行氣、增加胃酸，香附理氣、發散、補胃、通經、祛痰）。大蒜非盡熟煮（大蒜消腫、破積、化痰、利水），倉米忌用新鮮（陳倉米止瀉、進食）。薤白瓜蒌寬胸有益（薤白利竅、滑腸、開胸、散結，瓜蒌潤肺、止咳、消痰、通腸），葶薈萊菔化食無愆（葶薈消積、化痰、清熱，萊菔子化痰、消食）。菖蒲備健胃之力（石菖蒲祛風、止痛、開胃、除痰），半夏著止嘔之能（半夏止吐、平喘、祛痰）。其次消痰各物，二丹元益最良（丹參去瘀生新、通經、治萎黃病，丹皮除煩熱、消瘀血、鎮痛、通經，元胡索調經、治帶下及一切氣血阻滯，益母草去瘀、生新、治淋濁帶下）。茜郁莪莪均成奇迹（茜草去瘀、通經、止血，郁金調經散郁，莪朮除痰、通經、治癰癤，三稜消腫、通乳、下血），桃紅蘇澤各有專長（桃仁破瘀、潤腸、紅花活血、通經，蘇木和血、散風，澤蘭行血瘀）。

注：消法即消導的方法，凡是臟器受到障礙者，可分別採用。

还有牛膝与赤芍（牛膝舒筋、通經，赤芍活血、散瘀、通小便、治目赤），三棱及留行（川三棱定痛、行瘀、止血，不留行行血、通經、催生、下乳）。大凡破血之品，妇科恆用以調經。此外，榆槐秦翁都堪止痢（地榆治大便出血，槐角槐花同治腸出血，秦皮發汗、利水、解热痢毒，白头翁治热痢），夏枯藻布尽可攻坚（夏枯草降血压、治目疾，为藻癰聖藥，海藻治梅毒結核、消癰癰，昆布用同海藻）。金鈴乳沒止痛之用亦宏（川棟即金鈴子治疝，乳香活血、生肌、止痛，沒藥退翳、止痛）。若夫山甲土茯苓梅毒可愈（穿山甲搜風、止痛、排膿，土茯苓治梅毒惡瘡及關節攣痛），楓蛇蒼耳子癩毒以清（大楓子治麻瘋及梅毒，蕲蛇搜風、治癱瘓，蒼耳子主头風及癩疾，治鼻淵有效）。配用得法，病者每慶更生。

（六）和吐法（注）及其他用藥：

古称和解之藥，为数无多。涌吐方法，又恐使病者疲劳。今欲各备一格，于蜜棗草特取其緩和（蜂蜜潤腸解毒，紅棗生津、补胃，甘草补諸虛，解百毒）。

在吐剂之內，瓜藜明胆概与收罗（瓜蒂为催吐劇藥，藜蘆涌吐，明礬催吐，胆礬涌吐、去風痰）。

若夫榴梅使君堪医虫積（石榴皮殺條虫，烏梅固精、殺虫，使君子常殺蛔虫），胡連梔子專治疳癆（胡黃連退骨蒸热、殺疳虫，梔子殺虫、治痔）。此等品物，皆有利于儿曹。至于食物調

注：古有“病在半表半里宜和”之說，其藥多与清法同；吐法于食物初積在胃时用之，其藥为数甚少。

养，收效亦高。黑豆飴糖頗資补益（黑豆补血解毒，飴糖温中潤腸），扁豆蕎麥有助消磨（扁豆健胃、止吐、止瀉，其花清暑散邪，蕎麥消積、清腸）。龍眼蓮薏为餐最宜虛症（龍眼开胃、固脾、安神，蓮子止渴、安神、止夢、去热，薏苡仁利水、止瀉、治水腫、湿痹），鴨羊蛋酒配制能起沉疴（白鴨补陽、退虛热，羊肉主虛症痼痛，鷄蛋养心、补脾胃、退虛热，酒强心活血）。

中 医 書 籍

中医驗方（一集） 0.5 元

中医驗方（二集） 0.39元

中医驗方（三集） 0.37元

中藥保健箱 0.08元

常見疾病及其預防的中藥 0.16元

伤寒与温病診療表解 0.28元

[General Information]

书名=中医诊疗常识

作者=胡友梅

页数=90

SS号=10225972

DX号=

出版日期=1958年02月第1版

出版社=福建人民出版社

书名

目录

第一章 诊法录要

- (一)问症歌
- (二)切脉说明
- (三)脉象分类表
- (四)死症怪脉表
- (五)妇人诊病歌
- (六)辨舌歌
- (七)闻声歌
- (八)望诊歌
- (九)小儿诊法说明
- (十)小儿诊法歌

第二章 疗法录要

- (一)呼吸器病
- (二)循环器病
- (三)消化器病
- (四)排泄器病
- (五)神经系病
- (六)全身病
- (七)男生殖器病
- (八)女生殖器病
- (九)儿科病
- (十)外科病
- (十一)花柳病
- (十二)传染病

附录

- (一)伤寒症治
 - 1.六经病象七言歌
 - 2.六经症治总表
 - 3.太阳症治表

- 4.少阳症治表
- 5.阳明症治表
- 6.太阳症治表
- 7.少阴症治表
- 8.厥阴症治表
- 9.伤寒症治五言歌

(二)温病症治

- 1.温病七言总歌
- 2.温病上焦诊治表
- 3.温病中焦诊治表
- 4.温病下焦诊治表
- 5.风温五言歌
- 6.暑温五言歌
- 7.湿温五言歌

第三章 药方歌诀

附录：八法药性赋

- (一)汗下法用药
- (二)温法用药
- (三)清法用药
- (四)补法用药
- (五)消法用药
- (六)和吐法及其他用药